



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
818/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
818/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
818/A/1




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
818/A/1


818
A/1

F. III

16/b







663415
Georg.
24732
13.
940.

GEORGII

BERTINI CAM-

PANI

DE

CONSULTATIONIBVS

Medicorum

ET

METHODICA FEBRIVM

Curatione

COMMENTARIVS.



BASILEÆ

per CONRADVM VVALDKIRCH

MDLXXVI

166

Dum veteris leges Medicinæ expandere scriptis
Bertinus, Coa qua valet, arte parat:
Hunc ab eo sollers de multis antè paratum
Extorsit Sosius Bibliopola librum,
Quem veluti *ἡρόδοτος* dimitteret, omnibus indeq;
Auctorem notum, sicut ab vngue, daret.

D. LEBEVS. T.



CLARISSIMO
EQVITI NICOLAO
HARAVCVRIO HO.
DOVILLAE NOBILI REGIS
NAVARRAE à Cu-
biculo

GEORGIUS BERTINVS
Medicus S.



*Vm Montebelgardo (quò me è
nouissimis tempestatibus Gal-
licis subduxeram) huc à te
de morbo illo cuius velut im-
portuni tyrānidominatu tan-
diu teneris, consultandi causa aduocatus es-
sem, nullam intermissione officij feci, coad-
iuuante D. GVILELMO ARRAGO-
SIO Medico Cesareo et Regio, probitate &
doctrina commendatissimo, quin omni no-
stra cura studio atq; industria tibi tandem
meliusculè esset. Reliquum succissuum teni-*

A 2

PRÆFATIO.

pus, ad ea quæ de Vniuersa Medicina iam-
 pridem habebam instituta, perpolienda con-
 uerti, ut consecutus iam quod conabar, pa-
 ratum & instructum opus Typographo de-
 mandarim. Qui dum videt id ante initium
 anni venientis integrum excudi non posse,
 extorsit à me ut hunc cōmentarium de con-
 sultationibus Medicorum, atq; de necessaria
 earundē in curandis febribus methodo (in
 quo tractasse videor quæ nec fortasse satis
 sunt nota omnib. & sunt cognitione dignissi-
 ma) de penu illo depromere & velut super-
 fætationem ante partū in apertum proferre
 per me illi liceret, ut & mea sponte & eius
 inuitatu prodesse possem. Cū verò eum no-
 luissem antè à me dimittere, quàm patronū
 illi aliquē splendidum quæsissem, dignus oc-
 curristi mihi in cuius nomine appareret, cū
 propter summa quæ in te sunt pietatis, gene-
 ris virtutisq; ornamenta, tum ob rem ipsam
 de qua agitur, atq; ut quando abs te digres-
 sus ero, presenti declarationi & testimonio
 tibi sit hic libellus meæ in te obseruantia, ple-
 naq; studiij & officij voluntatis, qua et me ti-
 bi semper præstò futurum, spondeo. Vale,
 Basileæ Cal. Aug. CIO IO XIVC.

D E



DE
PARTICVLA-
RI REMEDIORVM
VSVRPATIONE ET ME-
THODO CONSULTATIO-
nis medicæ.

CAPVT I.



Nlegitima & tēpestiua re-
mediorum, & ^{valuationis} symelmi v-
surpatione, tria summa fide *In vltimo*
ac religione sunt perpēden- *3 conside*
da, nimirum diagnosis, pro- *da d. l. ge*
gnosis & therapeutice. In
diagnosi tria indicationum genera, nem-
pe quæ sunt contra naturam, præter natu-
ram & secundum naturā singulari cautio-
ne obseruabuntur. Primū in methodica
consultatione indicationes, quæ sunt con-
tra naturam ad amussim sunt examinādæ,
vtpote morbus, eiusdem natales & sym-
ptomata. In morbi perspicientia quatuor
summæ & celeberrimæ indicationes sese

I
Diagn

I cori
g. 12a

Mor

17
es

conspicuè detegunt, species, magnitudo,
mos & motus. Specie morbi arguunt natu-
ra, eiusdè pars affecta, humoris dominatus,
actio læsa, excrementorum conditio & alia
signa pathognomonica, quæ partis affectæ
& morbi eam obsidentis ideam referunt.
Non solum in morbo specie, sed eiusdem
indivium spectare oportet, quod ars nō
solum in illa, sed etiam in hoc versetur. Si
enim febris diaria sollicitat, considerata
quæ nam & à qua causa contrahatur. Si he-
ctica ægrum exerceat, providendum an
prima, vel secunda, vel tertia species sit. Si
continua essentialis, an causus, an lipyria,
an hemitriteus, an typhodes, an assodes,
an tertiana, an quotidiana: an quartana af-
fligat. Si verò febris symptomaticæ domi-
natu tenetur æger, æqua animi lance exa-
minandum est, an per congestionē ob par-
tis imbecillitatem, an per affluxū, siue per
destillationem, siue per palindromen ge-
nitum, siue per anaropē, siue per catarho-
pem sic inuehatur, an verò pars labe & cor-
ruptela conflictetur. Hæc eadem methodi
vestigia in affectibus partium sunt tenen-
da, ut si dolor capitis urgeat, ad vnguem di-
stinguendum est an cephalæa, à qua causa
contrahatur, & quam cerebri partem obsi-
dione cingat. Si melancholia, an hypochō-
driaca

Individuum
res.

Stomachus
Stomachus
Stomachus

melancholia

CONSULTATIONIBVS.

3

Triaca, an corpus vniuersum, an cerebrum tantū occupet. Si apoplexia, an debilis, an fortis: si conuulsio, an tetanos, an emprothoronos, an episthoronos: si inflāmatio oculi, an taraxis, an ophthalmia, an chemosis: si angina, an vera, an notha: si pleuritis, an vera an falsa: si phthisis, an à destillatione maligna, an ab ulcere pulmonis, an à spinali medulla proficiscatur. Si icterus, an felleus, an criticus, an hepaticus, qui aut ab obstructione, aut inflammatione, aut scyrro ingeneratur. Si hydrops, an ab interturbata, vel priuata vel abolita functione oriatur. Magnitudo verò seu efficacitas morbi ex symptomātū magnitudine, mos ex malitia, & partis affectæ cōditione, motus ex certis excandescentiæ periodis innotescit. Porro in vera morbi historia accurate perpendendum est, an sit acutus, vel longus, recens an inueteratus, an epidemicus, an primarius vel secundarius, an essentialis vel symptomaticus, an bene, vel malè moratus, an vniuersalis, an particularis, an primum inuadens, an alteri succedens, an simplex vel compositus. Sequitur ordine causæ scaturigo, quæ vel est euidēs, seu externa aut interna: hæc existit vel antecedens, vel continens, proprijsq; signis sese exhibet. Cōtinens verò ab antecedens

apople

conuulsio
inflam

angina

pleuritis

phthisis

icterus

hydrops

interturbata

abolita functione

magnitudo

mos

malitia

motus

excandescentiæ

periodis

innotescit

Porro

vera morbi historia

accurate

perpendendum est

an sit

acutus

vel

longus

recens

an inueteratus

A 4

*Humoris
spis.*

*Locus in
q. d. g. r. h.
h. f. e. r. t.*

*3
impro-
mata*

te, aut ab aëris vitio, aut ab incauta victus
ratione, aut partium internarum cōtagio-
ne genita, vel primam, vel secundam vel
tertiam corporis regionem obsidet. Pri-
mum studiosè iuu estigandū est an humor
sit crudus, vel leuiter vel multum corru-
ptus, qui in pristinam bonitatē redire non
possit, an facilis vel difficilis, an erodens
vel lenis, an crassus vel tenuis, an paucus
vel multus, an syncerus, vel cum sanguine
mixtus, recens vel inueteratus morbi for-
mam semper inferens, an vagus, vel adhæ-
rens, vel cū obstructione vel tumore, an
vitiolus, an corruptus humor cum alicu-
ius partis corruptela, an cōmitetur pletho-
ram vel cacochymiam. Adhæc plurimū
interest cognoscere vbi causa morbifica
localem habeat generationem, fugacem
cum simplici & parua intemperie coniun-
ctam, vel obfirmatam & inueteratam, in
quibus sedibus stabuletur, quam viam af-
fectet, & in quas partes proclinas omne
onus recumbat. Sicuti autem vnumquod-
que corpus, sic vnaquæque pars suos ma-
nes & suam noxam patitur. Symptomata
verò superfunt, quæ in functionibus læsis,
aut excrementorum vitio, aut simplici cor-
poris affectu consistunt, suapteque natura
& propria vnus cuiusque significatione
conspi-

CONSULTATIONIBVS.

conspicuè se detegunt. Sequuntur ordine indicationes, quæ secundum naturam existunt, utpote peculiaris ægri temperies, naturalis cōstitutio vel acquisititia, vel ab instituto vitæ sic comparata, vel calida, vel frigida, vel humida, vel sicca, vel obesa vel gracilis: plethorica vel mediocris, rara vel densa, languida vel robusta: quæ visu, tactu & ratione dignoscitur: nec non ætas, sexus & aliæ id genus, sine quarum exacta perspicientia tutò medicinā facere & solum adhibere non potest medicus. Præterea non sunt negligendæ indicationes præter naturam, suo loco iam copiosè descriptæ, & sine quarum sedula obseruatione irrita sunt curationis præsidia. Quod ad prognosin secundam vel sinistram attinet: morbi magnitudo vel malignitas, causæ vehementia vel contumacia, symptomatum feritas, partis affectæ conditio, dignitas & necessitas sunt cum viribus, cruditate vel coctione materiæ morbificæ conferenda, an natura morbi, an morbus naturæ sit potēs. Fida enim præfagia sunt, ex his, quæ necessariò accidunt naturæ & morbi ratione & robore: siquidem vis naturæ ex functionū integritate vel vitio, aut in partibus principib. aut alijs, quæ ab his propagantur, aut alijs, quæ administrationem

II

secundam naturam.

III Plerumque

II

prognosis.

Idcirco.

peculiarem obtinent, consistente dignoscitur: morbi verò natura ex specie, magnitudine, more, motu eiusdem, causa morbifica, ut materia cruda vel cocta innotescit. Quæ autem non necessario contingunt in crisi & solutione morbi sunt animi affectus, ut vigilia, tristitia, quæ iudicium interturbant. Eodem negotio tanquam ex alta specula prouidendum est, ex quatuor morbi, temporum, cruditatis & coctionis crisis, ad diem crisis & excretionis signis, quis & qualis sit morbi exitus. Morbi enim ob qualitatem materiæ morbificæ, crassam vel tenuem quantitatem, paucam vel multam virium effœtationem, vel robur, & cutis meatus reſeratos vel occlusos aut excretionem, aut diuturna coctione, aut metastasi seu commutatione terminatur: siquidem febres acutæ ex bilioso humore, quantitate mediocri contractæ in corpore vegeto, poris apertis & cælo calido per excretionem solvuntur. Ut enim vnumquodque animans proprium vitæ tempus: sic vnus quisque morbus peculiarem terminum nascitur, nisi hic à medico malè curante, & ægro delinquente interturbetur, aut humor sit turgens, qui orgasmo quodam in partem aliquam principem irruat: humorum enim aliquam partem occupantium certæ

certæ prænotiones: vagantium & furentium, qui in aliquam partem principē impetu decumbere possunt, incertæ omninō existunt. Febres verò acutæ ex humore crasso & multo profectæ in viribus elanguescentibus, cutis densitate & constitutione frigida ob insignem morbi efficacitatem, & contumacem materiæ morbiferæ sequacitatem per coctionem sensim, aut per metastasim, aut per exitialem catastrophem iudicantur. Cum enim ad magnitudinem morbi, aut ad potētem causam aut ad partem principem affectam virium infirmitas accedit res ægri sunt in deteriore & angusto loco. Ad hæc quò plures affectus ægrū immaniter exercent, tantò magis aliquid sinistri portendunt. In hoc negotio nō sunt negligenda peculiaris similitudo & dissimilitudo huic cōtraria, quæ in colore, charactere, mole, motu & functionibus singularum partium versatur. Quinetiam medicus insignis decretorijs & excretionis impetu sagax & prouidus esse debet: quæ quidem peritos delectare, ignaros deterrere solent. Cæterum medicus non modo certum iam nati morbi uentum præsentire, sed etiam nascentis & imminēis minus obscura signorum significatione instantem insultum præuidere

*J. D. Lion
& n. a. s.*

Signa

Causa
du.

III

erapen
ce.

debet, non aliter quàm nautæ futuram cæ-
 li tempestatem præcurrentibus signis præ-
 sagiunt. Etenim cacochymia, cachexia,
plethora, capitis grauitas & dolor, obmur-
murantes aurium sonitus, pulsatio tempo-
rum, lachrymæ & caligines oculorum in-
iussæ, palpebræ intumescences, odoratus
hebetior, sudor vndique diffluens, pruri-
tus, lingua crassescens, frequentior expui-
rio, lassitudo spontanea, vigiliarum impro-
ba fatigatio, suffocationum anxietas, sitis
insolens, ex somno labor, animi anxietas,
ventriculi dolor, inflatio, oris amaror, lum-
borum & spinæ grauitas, dolor, excretio-
nes nō naturales & id genus alia signa in-
stantes morbos significant: quibus præcau-
zione, q̄ aut in alteratione, aut pharmacia,
aut phlebotomia cōsistit, statim occurren-
dum, est vt integra sanitas redeat postlimi-
nio, sine qua eximiæ animi dotes & præ-
stantes corporis gestiones splendere ne-
queunt. Quocirca nihil sibi reliqui faciet
ad omnem diligentiam medicus, vt ex na-
tura, causis & effectibus vniuscuiusq; mor-
bi & aliorum signorum significatione su-
prà commemoratorum de opportunis &
legitimis remedijs cogitet, vel deploratos
ægros curandos non suscipiat, & de certo
morbi exitu pronuntiet. Superest thera-
peutice

peutice seu medendi methodus, quæ consistit in decenti qualitate, quantitate, vsu modo, & vtendi occasione, phlebotomiæ, pharmaciæ & diætæ, sumptis indicationibus à specie, magnitudine, more & motu morbi. Sicuti equidem ex facto ius, sic ex morbi cognitione curatio dependet. Sunt præterea duo profligandorum morborum lumina, nempe methodus & prudentia, de quibus obiter hîc differendum est. Tria verò sunt vniuersalia celeberrima præsidia, quorum duo materias communes excludunt, nempe purgatio, cacochymiam: vacuatio plethoram subtrahunt: diætâ verò virium conseruationem spectat, aut intemperiem alteratione corrigit & emendat. In phlebotomia non modò magnitudinem morbi & virium robur, sed etiam naturam corporis, humoris & cæli summa religione animaduertere debet medicus. Nam qui sunt corpore raro donati, & qui regionem ad meridiem spectantem incolunt, paucam & raram sanguinis missionem ferunt. Quæ enim lege nature sunt commoda, ex euentu vt plurimum sunt incommoda. Ad hæc singulari iudicij trutina examinandum est, quæ vacuatione vnaquæque plethora demenda est: si quidem plethora pura, tutissimè: impura, non æquè tuto tollitur

2^o lumina
curant.

3^o vniuersalia
præsidia
phlebotomia
purgatio
diætâ

Met. Soc.

phlebotomia



litur: impura enim calida, audacter: melancholica parcè: pituitosa, parcissimè substrahitur. Plethora verò ad vires, quæ nec vasa disrumpere, aut calorem obruere potest, cum tamè imbecillas vires premar ne quæ putredo succedat, vacuatione demitur, quæ tantum relinquit, quantum natura facile moderatur. Quinetiam in hoc plurimus sit medicus necesse est, vt studiosè obferuet, quos & in quibus morbis per aphæresim, id est vniuersalem, & epaphæresim, id est, particularè vacuationem detrahat. *Pharmacum* verò peculiari vniuscuiusq; naturæ qualitate & quantitate humoris peccantis, & causæ morbificæ, semper habita virium ratione, analogum esse debet. Vtenim corpus cacochymum robustum portione medica leuatur: sic imbecillius simul cum pharmaco tollitur. Quare in virium infirmitate pueris clementiora: naturæ grandioribus & vegetis validiora & efficaciora sunt exhibenda præsidia. Vtendi verò modus pro inclinatione naturæ, ætatis, materiæ morbificæ, morbi & meatibus patentioribus, commodioribusque: occasio verò pro eiusdem morbi moru instituetur. Interim præterita causa à medico semper est expellenda, præsens submouenda, & futura prospicienda. Quæ cum ita sint vbi
 humor

*Pharmacum
 G. a.*

CONSULTATIONIBVS.

humor exuperat vel deficit aut qualitate,
aut quantitate, aut commutatione, aut cō-
nexionē praua, aut putredine, studiosè p-
curandum est quale, an simplex vel com-
positum: quantum, quàm validum, per que
loca conuenientia, qua ratione, quo ordi-
ne, qua forma, quo tempore, & quàm diu
corpori, aut parti adhibendum sit. Porro
diæta virium rationem respiciens, vel est
vniuersalis, quæ secundum quatuor mor-
bi tempora: vel particularis quæ in perspi-
cuis accessionum inducijs administratur,
iureque & loco instituitur, vt iure in exhau-
sto & virium effestatione: loco in accessio-
num intermissione. Tria profectò sunt ex
quibus victus ratio sumenda est, primum
ex viribus, secundum ex morbi constitu-
tionē, tertium ex accessionum particula-
rium prænotione. Siquidem de cibo vere-
ri oportet in paroxysmis, & in periodica
naturæ perturbatione, vt in accessionibus
colicis, doloribus capitis & aliarum para-
rium. Ea autem cautione & religione nu-
triendus est æger vbi facultas præceperit
& morbus non prohibuerit, ne à pepses
aut pepasmi penso distrahatur natura. His
ita stabilitis quo pacto hæc p̄sidia ritè sine
adhibenda strictim & obiter discutiendum
est. Therapeutices, seu curandi methodi a-

Diæta

*Moderat
adhibenda*

*p. can. 2i**curatio.**2. 1. 1.**1. 1. 1.**In acutis
dieta.**Longis.**grauis.**1. 1. 1.**p. 1. 1. 1.**Longis.**p. 1. 1. 1.**1. 1. 1.*

lia est præcautio, quæ non morbum, sed causam morbi spectat: alia est curatio, quæ affectum urgentem oppugnat. Præsens autem seu vrgens vel est essentialis aut symptomaticus: essentialis verò vel est simplex, ut acutus, peracutus aut extremè peracutus, primarius, vel secundarius, vel compositus. Symptomaticus autem aut ab inflammatione, aut à partis corruptela, aut à putridis humoribus circa eam congestis proficiscitur. In morbis acutis victus tenuis: in peracutis tenuior: in extremè peracutis tenuissimus: in longis, plenus instituendus est. Quantitas huius ex qualitate, copia & numero ducta, pro virium robore, & morbi constitutione præscribetur. Vrendi modus ex qualitate, copia, numero, cibo parum vel multum nutriente, longioribus vel brevioribus interuallis sumpto decerneretur. Qua parte autem natura conflictatur, hac illi sic opitulandum est, ut viribus alimentorum pepsi & exhausto, opportunè succurramus, & morbo ferocieti occurramus. In morbis peracutis & extremè peracutis, qui vehementer, celeriter & continenter mouentur, & quando natura statim erit in procinctu protinus ad phlebotomiam confugiendum est, quæ portionem causæ morbiificæ exhauriat. Pharmacia verò tunc est

suspe.

suspecta, quæ febrem auget, & ad ex-
descentiam proritat, viriumque robur in-
fringit. Morbi autem qui lento gradu pro-
cedunt in hisq; lugent sub pondere vires,
phlebotomiæ & pharmaciæ præsidijs pau-
latim per epicrasim materiam peccantem
demoliri opere precium est. Interim pluri-
mum blandis medicamentis seu minora-
tius humores in prima corporis regione
stabulantes sunt excludendi, sensimq; ex-
turbandi. Et enim in morbis longis à leui-
oribus semper est auspicandum, certamq;
qualitatem, quantitatem, vsus rationem &
occasionem præparationis sumptis indi-
cationibus à qualitate, copiâ, situ & motu
humoris instituere semper decet, quod
in singulis morbis, siue magnis siue paruis
æqua laxe examinandum est. Vt enim cer-
tus temperamentorum in corporibus, sic
in medicamentis ordo perpendendus est,
vt morbis paruis blandiora: magnis vali-
diora præsidia adhibeantur, vt sunt pyro-
technia extracta, quæ Gale. in lib. de the-
riaca ad Pisonem approbat & parat. In a-
lijs verò, in quibus est brevis historia, sta-
timque orgasmus aut eclampsis adest, mo-
ram nullam postulat morbus, protinusq;
adhibenda sunt sine cunctatione remedia.
Porro in varia multorum affectuum syn-

drome miscenda sunt quæ humorum putridorum varietatem & singulas partes affectas spectant, sicque topica remedia methodica curatione sunt adhibenda. Eodem negotio procurandum est ne per metastasim morbus in alium affectum mutetur: ut diaria plethorico corpore existente in synochu: cacochoymo, in febrem putridam: sicco, in hecticam promptè transeat. Huc accedit quod in morbis symptomaticis, & in legitima febrium symptomaticarum curatione duo veniunt accuratè spectanda, fluxio & inflammatio: fluxionis seu palindromes prælentissimum præsidium est reuulsio: fluxione sedata inflammationis curatione suo loco tradita tentanda est. Cum verò post vehemenciam vel diurnitatem morbi intemperies, vel imbecillitas & humorum reliquie ut plurimum supersunt: intemperies seu diathesis morbosa primo loco emendanda est, ne nouam cacochoymiam & luxuriantem humorum prouentum progignat: siquidem ventriculus intemperatus & imbecillus malâ chylosim: sicuti hepar intemperie & imbecillitate affectum, viciatam hematosin celebrat, inde ex vtriusque partis vitio cacopragia emergit, ex qua copia humorum recidiui affectus soboles succrescit, Vires autem recreabuntur

abuntur alimentis euechymis, cardiacis & hypnoticis, sumptis indicationibus à natura humoris & celi: nam temperamento, humori & celo calido, liquida: humido, sicca conueniunt. Humorū reliquie blandis pharmacis excluduntur ne superstes cacoehymia affectum priore deteriore mignat: syncerum autem nisi vas, quodcumque infundis acersit. Porro vt hec omnia votis respondeant & in vsum reuocentur, desideratur prudentia, ad quam recta ratio, cautio & prouidentia referuntur. Recta ratio, fit quando vniuersa theoremata particularibus & singularibus ad amulsim accommodantur. Non enim authore Galeno satis est communem naturam agnouisse: sed etiam operæ precium est priuatam & peculiarem exactè cognouisse, quæ ex rara vel densa conflatur: quippe hoc ex frigore & materia crassa, illud ex ea tenuiore & vi caloris magis defecata cõponitur. Prouidentia verò est, quæ certis signis futuras res auguratur atque præuidet, sicquæ succurrit medicus vt in angina & in muliere circiter vigorem paritura, magna fore symptomata & virium insignem effœtationem prospicit, vberiore & liberaliorem ante hoc tempus victus rationem decernit, vt futuræ virium iacturæ consulat. Nam æger

II.
p. 21
21
R. 21

prouide
21

in anginae vigore nihil prorsus deglutire potest: mulier verò in partu iam viribus fractis & prostratis statim succumberet. Cautio verò fit, quando medicus in hoc totus est vt singulari iudicij acie morbos distinguat, incognitos pro cognitis non habeat, & eisdem curatu difficiles pro facilibus amplectatur, & praua pro probis in egrorum perniciem perperam suscipiat, pretiaque ob ignorantiam ferat. Quare haftenus dictum est de particulari remediorum usurpatione, & methodo consultationis medicæ, quæ in decenti diætæ minoratiuorum seu blandorum medicamentorum vacuationis, præparationis & purgationis, qualitate, quantitate, vsus ratione & occasione sumptis à specie, magnitudine, more & motu singulorum morborum indicationibus postea elucescet.

De curatione diariarum Cap. II.

CVM medendi methodus sit tuta & re-
pestiua remediorum applicatio, cer-
tus theorematum, verorum, vtilium, & in-
ter se conuenientium ordo, vniuersalis &
ordinata, rationiq; consentanea curando-
rum morborum via, quæ omnium singula-
rum cõmunis euadit, hæc eadẽ in singula-
rum febriũ curatione nunc excutienda ve-
nit

CONSULTATIONIBVS.

nit exordio sumpto à diaria, quæ in aerea
& spirituoſa ſubſtantia exandefcente reſi-
det. Communis autem materia & indica-
tio diariarū eſt aerea ſubſtantia præter na-
turam incaleſcens, & à cauſa procatharti-
ca recenti originem ducens. Prima igitur
indicatio à morbo, & à ſimplici contra na-
turam calore, qui refrigerantibus & hu-
meſtantibus præſidijs ſumptis, & admo-
tis legitimè & cōmodè proſtigatur. Quin-
etiam ſumitur indicatio à cauſa, pro cuius
varietate particulares & diuerſæ curatio-
nis indicationes ſeſe offerūt. Nam quam-
uis omnes febres diariæ ex ſpirituoſa ſub-
ſtantia accenſa cauſas trahant, vno die de-
ſinant, & refrigerantibus, humeſtantibus-
que ſubſidijs indigeant; tamen pro cauſa-
rum varietate particulares & diſſimiles
emergunt curationes. Vnde cū Galeni *Defenſio Ga-
leni.*
aduerſarij non aſſequerentur, primam in-
dicationem à morbo, nec nō præcipuam,
vtilēque à cauſa ſumendam eſſe, in va-
rias errorum ſalebras inciderunt. Indica-
tio enim prima & vniuerſalis tanquam ſu-
ſcitamentum à morbo ſui ablationem per
contrarium indicat. Siquidem indicatio
prima, quæ à morbo depromitur, ſui abla-
tionem ſine aliqua rationis & cogitatio-
nis ope, tanquam aliquid nocēs compræ-

hendit Indicatio verò à causa sumpta ali-
quid magis speciatim & vtile, & quid mol-
liendum sit, certò indicat. Cùm enim sit
comprehensio nocentis & iuuantis, sen-
sui communi & intellectui hæc sese pro-
xime offerunt, cogitationisque & ratio-
nis obsequio minimè opus est. Nam au-
thore Gale. bruta etiam animantia primo
& peculiari intuitu consequuntur vtilia,
& noxia fugant. Nemo nescit, quòd si
spina aliqua digito infixæ sit, sine cogi-
tatione, ratione, & arte rusticus stupi-
dus sola indicatione à comprehensione
nocentis deriuata, hanc eandem spinam
offendentem sine vlllo rationis & consulta-
tionis discursu euellit. Itaque his ita pri-
mum stabilitis omnis diaria quatuor reme-
diorum generibus expugnabitur.

Victus ratione, nempe alimentis na-
tura humidis & concoctu facilibus, quæ
pro varijs causis, viribus, & conditio-
ne ægrotantis tutò decernuntur. Qualitas
enim victus, vt supra demonstratum est,
à natura morbi, viribus & natura ægro-
tantis instituitur: sicuti eiusdem quanti-
tas pro magnitudine affectus, viribus, &
ætate ægri, & pro accessione inducijs
exhibetur. Primum qui animi affectibus,
labore, vigilia, mœrore, timore, & frigo-
re fe-

re febricitant, cibis boni succi, & vino oligophoro diluto sunt recreandi. Qui verò febre corripuntur ex dolore, furore, & inguinum inflammatione, à vino vt placuit Græcis & Arabibus sunt arcendi. In quorū colonia censendi sunt, qui repletionē laborant. Qui porrò febricitant ex ira, & ardore, refrigerātibus; qui frigore in febrem diariam inciderunt, moderatē calfacientibus sunt alendi: sicuti qui ex vigilia febricitant, somnum conciliantibus recreandi veniunt. Quinetiam quantitas præscribetur pro ægri natura, & varijs febris causis. Plethorici autem inguinum inflammatione & ebrietate affecti, tenuiori victus ratione sunt nutriendi. Græci & Arabes in animi affectibus, vt in cura, timore, mæstitia, & lætitia vinum non denegant, sed ab eius vsu arcent, qui ex ira & dolore febricitant. Occasio verò cibi porrigendi præcipuè sumitur ab accessionis inducijs: nam sumitur indicatio ab accessione & motu morbi non tanquam decernens, sed tanquam prohibens, quæ tunc temporis nihil teste Hippocrate, dandum esse inhihet. Quocirca exhibendus est cibus in declinatione febris. Sed cū necessitas vrget ad curationem extraordinariā statim confugiendum

est præcipuè in his, qui febricitant ex fæ-
me, labore, & tristitia, quibus in principio
febris cibus non est denegandus.

II. Causam abigētibus, quæ Galeno lib. 10.

Method. cap. 2. duplex est, aut cum causa
effectrix abiit, vt exustio à sole, quæ mora
sub vmbra, alimentis alterantibus, nempe
refrigerantibus, & humectantibus oblite-
ratur: altera non effectrix causa adest, non
ita propria & exquisita censetur, vt febris
ex inguinum inflammatione contracta, quæ
teste Aetio sanguinis missionem postulat.
Porro febres in quibus causa adhuc co-
mitatur, contrarijs præsijs propulsandæ
veniunt, vt meatuum densitas, aperienti-
bus & discutientibus, febris à labore pro-
fecta, quiete, à vigilia nata somno: sicuti
mœror, animi tranquillitate, lætitia, mœ-
roris auxilio abigitur. Præterea Græci &
Arabes censent diariam plurium dierum,
discutientibus, & sanguinis missione cu-
randam esse.

III. Prohibētibus ne diaria in aliam febrem
mutetur cæcos cutis meatus dilatando, va-
pores resoluendo, & calorem alterando
balneis & frictionibus. Febres autem om-
nes diariæ teste Galeno libr. 1. ad Glauco-
nem balneis sunt profligandæ. Qui enim
ex cutis densitate, aut inguinis inflamma-
tione

ione febricitât, aëre balnei supramodum
iuuantur. Reliquos omnes quàm citissimè
ab aëris occursione semouere oportet. O-
leo verò multo tepido & manibus mollib.
perfricare quàm plurimum, sed eos præ-
sertim, qui ex labore in febrem incidunt,
secundo loco, qui meatus habent obstru-
ctos, ac teritiò qui inguinum inflammatio-
nem patiuntur, quos nimirum sæpius laua-
re expedit: tamen vt idem testatur Galen.
lib. 8. Methodi vlcus, quod bubonem inue-
nit, curandum est antequàm sit tutus bal-
nei ingressus. Præterea diaria plurium die-
rum non solû sanguinis missione adimen-
da est, sed cibi & medicamenta ex his, quæ
detergunt, exhibebuntur. Cùm enim hu-
morum exuperantia sit causa effectrix, vt
diutius protrahatur febris, primum vacu-
atione tanquam præsentissimo remedio
succurrendum est. Deinde humorum cras-
sities extenuantibus, lentos detergētibus,
& cutis densitas rarefacientibus radicitus
extirpantur. Mesue febricitantes tristitia,
oleis frigidis & humidis astrictione caren-
tibus, nempe oleo violaceo & nenupha-
re curandos esse censet. Ad hæc iubet fe-
bricitantes labore & calore balneis aqua-
rum dulcium oleo simul permisto lauan-
dos esse. Qui verò febricitant ex quiete,

balneis discutientibus ad sanitatem fun-
reuocandi, si eidem fides adhibenda vide-
tur. Dexter porrò balneorum vsus ea cau-
tione est instituendus, vt sine horrore in
declinatione febris impuris humorib. in
prima corporis regione minimè scatentib.
catharro neutiquam urgente, & parte prin-
cipe non affecta administretur.

v. Symptomata emendantibus, vtpotè si-
tim demulcentibus, quæ syrupo violaceo,
aut iulepo Alexandrino cum aqua cocta
mixto imminuetur. Quinetiam portula-
ca in ore contenta, & conserua rosarum
sumpta sitim fallere creduntur. Dolori
capitis betonica fronti admota mirificè
opitulari censetur. Somnus verò conci-
liandus erit conserua rosarum fronti ad-
mota, vel vnguento populeo carpis ma-
nuum imposito, vel fotu lactucae, mal-
uæ, & violariæ, quò pedes & manus ho-
ra somni lauentur. Quamobrem cum dia-
ria sit exigui temporis, & curatu facilis,
raroque ad huius curationem vocetur me-
dicus, plura non dicam, cum etiam Gale-
nus de hac fusissimè scripsit.

De curatione synochi non putris.

CAPVT III.

SYNOCUS non putris ab exuperanti san-
guinis inflammati copia contracta ma-
nife-

nifestum sui specimen edit in corpulentis plethoricis succulentis, & rubicundis. Præcipua igitur indicatio à plethora & sanguinis inflammati vbertate sumenda venit, & quinque remediorum generibus extruditur.

Victus ratione refrigerante, humectante & tenui, vt prunis elixis, hordeatis, panatellis ex pane loto confectis, & ptisana. In legitima autem victus ratione minimè peccandum est, quæ pro virium robore & ægri tolerantia decernitur. Siquidem qualitas à natura morbi, viribus, & conditione ægrotantis, quantitas ex magnitudine affectus, viribus & ætate, ægri exhibetur. Quo equidem morbus acutissimus, eò tenuior victus est præscribendus. Modus vsus alimètorum in hoc versabitur, vt potus actu frigidus, præcipuè instituatur. Superest occasio, quæ cibum eo tempore ægris decernendum esse indicat, quo hi vesci consueuerunt. Præterea placida animi tranquillitas, corporis quies, somnus mediocris, & fuga vini imperentur. Ptisana seu aqua hordei, testimonio Arabum, est flatulenta, quæ addito & incocto coriandro emendabitur.

Minuentibus humorem in prima corporis regione congestum clystere potius, quàm pharmaco, ne sanguis ob portionem


sumptam magis excandescat. Quamuis autem fæces & humores excrementitij in intestinis cumulati febrem synochum non pariant, & in continente causa non censetur, hanc eandem ramen non parum augment. Idcirco in hoc laborandum est, ut semper bellè respondeat aluus, humoresque superuacanei ænematè refrigerante, emolliente, & purgante excernantur, nempe libra vna decoctionis maluæ, althææ, lactuæ in qua dissoluantur cassiæ recens extractæ, sacchari rubri singulorum vncia vna, & olei violacei vnciæ tres.

- ¶ III. Vacuatione, nempe sanguinis missione, quæ mutuo Græcorum & Arabum consensu usque ad lypothimiam administranda est, modò vires & aliæ indicationes non reclamant, siquæ aliqua indicatio hanc dissuaderet, tunc minori copia per vices repetita opus esset. Interim sanguis statim mittendus est, ne pleuritis aut peripneumonia ad ægri perniciem protinus consequatur, synochusque non putris repente faciescat in putrem. Cum igitur sanguis copia exuperet, citò euacuandus venit, quod natura morbi & vires ægrotantis id persuadeant. Quantitas verò à primarijs indicationibus nimirum morbo & viribus ægri, & secundarijs à temperamento & corporis ha-

Quantis habitu, nec non coindicacionibus ab ætate, cæli statu, victus ratione, vacuatione præcedere immodica, vel suppressa, & ex futura actione læsa depromptis, regioneque calidior vel frigidior, vel meridiæ vel septentrionem spectante.

Purgantibus humorem biliosum drachma vna & dimidia, aut drachmis duabus, rheibarbari electi infusis & maceratis, aut in succo rosarum, aut in stillatitio cichorij liquore, aut in decocto cichorij, endiuia, oxalidis, thamarindorum pinguium, prunorum, quatuor seminũ frigidorum maiorum, & florum cardiacorũ, addendo syrupi ex infusione rosarũ fescũciam, trochisco rum è caphura parum. Accidit enim vt tenuior sanguinis portio in bilem promptè mutetur, cuius qualitas pro natura morbi, quantitas pro magnitudine eiusdem, conditioneq; & natura corporis, humoris, & cæli semper præscribitur. Galeni aduersarij hîc obiter reprehendēdi sunt, qui hunc accusant, quòd malè scripserit medicamentum tota substantia non forma humores purgare, cùm per totam substantiam formam intellexerit.

Alterantibus & poros aperientibus. Cũ enim signa concoctionis apparent, aquæ frigida potus suffragijs medicorum Græc



corum & Arabum est propinandus, mōdō æger non sit infirmo ventriculo. Alio-
qui satius esset miscere cum aqua cocta
symplos vel è limonibus, vel acerosi sim-
plicis, vel violaceum, vel conditum ex
conseruis rosarum, oxalidis, nymphaeæ,
& puluere diamargariti frigidi compara-
tum, & ægro exhibere. Prætereà cautio-
nes in propinanda aqua sunt perpenden-
dæ ex natura ægri frigida, vel gracili, ex
parte affecta, vt inflammatione, & abcessu,
& materia adhuc cruda. Quarto die teste
Galeno ad balneum aquarum dulcium du-
cendus est æger, frictioque instituenda.

crits.

Sympt.

Quinetiam ad obtundendum calorem e-
pithemata regioni hepatis & cordis in lib.
de compositione Medicamentorum de-
scripta admouebuntur. Nisi equidem in-
temperies relicta elueretur, aut recidiuus,
aut nouus affectus priore deteriore excita-
retur. Porro si quæ symptomata sese offe-
runt, peculiaribus remedijs minimo ne-
gocio corrigentur. Semp̄ verò in hoc la-
borandum est, vt necessarius singularum
partium calor innatus & influens hu-
ius sartor & reparator, quoad
fieri possit, integrè con-
seruentur.

De

De curatione synochi putris CAP. IV.

Synochus putris, aut ab exuperanti sanguinis fœnore, aut à permistione, vel bñs, vel pituitæ corruptæ genita septē prædijs radicatus extirpatur.

Victus ratione refrigerante & hume-
tante, tenui & non multum nutriente,
uæ in legitima & tempestiua qualitate,
uantitate, vsus modo, & occasione sumē-
orum, admouendorum, educendorum,
& faciendorum artificiosè versabitur, vt aë-
e, natura, vel industria refrigerante, cibis
refrigerantib. veluti prunis elixis, hordea-
is, iusculis borraginis, buglossi, lactucæ,
ortulacæ, endiuie, & oxalidis, panatellis
x pane loto confectis, & ptisana, quiete
corporis, iucunda animi tràquillitate, & a-
ijs eiusmodi, quæ desumētur à natura mor-
i, viribus & cōditione ægrotātis. Quanti-
as p magnitudine affectus, virib. & ætate
egri variè exhibēda venit. Quod ad modū
ius spectat, alimenta liquida concoctu fa-
ilia, & actu frigida sunt porrigenda. Ga-
enus verè atque sapienter scripsit à carni-
ous absis abstinendum esse.

Humorem minuentibus, vt clystere e-
molliente, euacuante, & refrigerante su-
periora commemorato, vel vncia vna cassiæ

1. v. s. f.

me l. c.

11.

cl. s. f.

recenter extracta, & bolo exhibita, præcipue si prima corporis regio magna humoris impuritate sordescat. Hoc semper ratum esse debet, ut humor vitiatum in prima corporis regione contentum in principio repurgetur, ne eiusdem humoris putridi colluies ad maiorem perniciem in secundam transferatur, contumaciorque obstructio inuehatur, affectusque ferocior euadat. Ex hisque colligendum est, quod sanguinis missio purgationem semper antecedere non debet.

iii. Vacuatione, nempe sanguinis missione, cuius quantitas pro viribus ægri, temperamento, corporis habitu, & ætate, natura cœli, & victus ratione, vacuationeque suppressa vel immodica præcedente decernitur. Cum autem sanguinis exuperantia sit præcipua causa prohibitæ transpirationis & putredinis præsentissimum remedium in euacuatione versatur, quæ in principio semper administranda venit, ne in anceps suffocationis periculum præcipiterur æger. Putredinis equidem labes quam citissime fieri potest, submouenda est, ne sanguinis moles magis vitium faciat, feritasque affectus magis excandescat. Si vires non ferant sanguinis missionem, quæ ad hypochimam celebratur, tolerabilior repetitio

petitio censeatur. Reformidanda est nunc antiquorum ad viginti quatuor vascula vacuatio, quòd singula vasa vncias quatuor contineant.

Apparâtibus humorem nempe crassum extenuando, & lentum detergendo. Obstructio enim causas trahit ab humoribus multis, aut crassis, ad cuius expeditiorem victoriam multi primo loco sunt euacuandi, è vestigio crassi extenuandi, & lenti simul detergendi veniunt. Nam cum in synocho, aliquando bilis vt plurimùm, aliquando rarò pituita, aliquando rarissimè humor melancholicus simul cū copioso sanguine vitium facit, fit synochus, vnaq; sanguis, id est maior portio omnium humorū ad putredinē procliuior euadit, vel alius humor cum exuperanti sanguine putrescit. Itaq; siue sanguis putredinis labē induat, tenuiorq; eius portio in bilē promptè transeat, siue pituita aut bilis pariter & simul corrumpatur, apparādus erit humor, vt bilis vitellina alicuius crassitie particeps, aut alterius humoris comes, incidentibus absque manifesto calore, nimirum syrupis ex acetositate citri, è cichorio cum aquis stillatitijs, oxalidis, endiuia, & buglossi. Quin etiam si pituita simul permiscetur, oximel simplex, & syrupus capilli veneris non in-

C

IV.

Sp. p. 3
no. 2. m. m.

commodè cōmisceri poterunt: sicuti si hu-
mormelancholicus (quod rarissimum est)
putredinem induit, syrupi è buglossò, è
fumaria & è lupulis permiscebuntur. Syru-
porum dosis vt plurimum est sescunciæ, &
vnciarum duarum, & decoctionis vel a-
quarum stillatitiarum vncias tres non su-
perat. Arabes ad corporis præparationem,
decoctum seminis altheæ præscribunt.

Finis 285
v. Purgantibus humorem præparatum in
principio & incremēto, cuius quātitas ex
magnitudine morbi, viribus ægrotātis, na-
tura morbi & humoris, & conditione ægri
æstimabitur. Porrò si humor biliosus exu-
perat, fiet infusum ex 3. 2. reibarbari electi
gran. 5. spice nardi, myrobalanorū flauarū
confricatarū, oleo amygd. dulcium 3. 3. vel
semuncia in aqua cichorij, vel in decocto
thamarindorum pinguium, prunorum da-
mascenorū 4. seminum frigidorū maiorū,
& trium florū comuniū expressioni cola-
tæ, addetur syrupi ex infusione rosarū 3. 1.
& trochiscorū è caphura 3. dimidijs. Me-
sues opinatur humore tenuē coctione in-
crassandum esse, ne excernēdo erodat. Sed
si natura & per se tenuis euadit, humor sta-
tim repurgandus videtur, ne diuturniore
mora quam excretionē maius incommo-
dum adferat.

Alte-

CONSULTATIONIBVS.

31

Alteratibus & discutientibus. intemperie vi
 & imbecillitate à feritate morbi relictâ, re-
 liquiasq; humorû, ne recidiuus affectus su-
 scitetur. Calor. n. febrilis frigide aque potu
 aut aqua hordei, coriâdri, & glycyrrhizę a-
 ctu frigida, aut syrupo ex acetositate citri
 simul perfuso obtunditur, exhiberiq; debet
 cū signa coctionis se detegūt, eaq; lege, mo-
 dō æger sit firmo ventriculo, nullaq; labe-
 n viscerib. internis sublit. Cōsultius aut es-
 set tūc ad tabellas diamarg. frigidi, ptisanę
 cū rosarū cōserua permistæ, potū, & epithe-
 mata accōmodata confugere. Quinetiā cū
 prohibita trāspiratio à meatib. cutis densa
 is genita integrā febris solutionē remore
 tur frictionib. poros aperientib. & rarefaci-
 entib. veluti decocto, vel oleo camemeli a-
 limetur & reserabitur. Interim habēda est
 semper ratio humoris morbū cōmittentis.
 Nā febris synochus est ex colonia acutarū
 o ardentiu, sanguisq; qui in bilē facessit,
 ebrē mitiorē quā ea, quæ ex bile iā diu pu-
 rida ingenerat. Vbi. n. bilis vitellina iā diu
 oncalescēs diutius in corpore immoratur,
 ebrē vehemētiore parit: sed sanguis putres-
 cens tenui portione fit biliosus, nō ita cal-
 et retorridus, & crassitie melanch. vt ab a-
 ra bile profectus febrē mitiorē inuehere
 oler. Præterea hic obiter notandū est, qd

thor.
hic

C 2

si sanguis in paruis venis putrescit, tertiae febris naturā redolebit, veluti si in partem aliquam irruat, protinus inflammationem committit.

VII.

*Sympt.
Limon.*

Symptomata emendantibus, ut sitim & putredinem arcentibus syrupis ex acetositate citri, è limonibus cum aqua cocta sumptis, & conditis ex cōseruis rosarum, nymphaeae, & puluere diamargariti frigidi comparatis. Somnus conciliandus erit somniferis sumptis & admotis: fit autem somnus cū calor à superficie ad cētrum reuocatur, tuncque benigni vapores in cerebri arcem irrepunt. Vnde tunc somnifera instituuntur, quòd his calor intercipiatur, ne in cerebrum conuolet.

De curatione febris hecticæ. Cap. v.

EXimij & periti medici non solūm tutò & iucundè omnem affectum profligare debent, sed etiam in hoc plurimi sint necesse est, ut citò remedia decernant. Quod sedula opera in febris hecticæ curatione, ob præcipitem morbi feritatem, labascentem virium infirmitatem, & exhaustā, permutatamque calidi fixi & influentis substantiam tentandum est, antequam in febrem marasmodem traducatur. Natura enim solo instinctu functiones explet, & mor-

morbū tanquam ſæuiſſimū hoſtem depellit: ſed liqueſcentem effluuij iacturam ſine oportuna medici ope reparare nequit. Heſtica igitur citra maraſmum, quę aut ardentibus febribus, aut inflammationibus & vlceribus partiū principum, aut diarię ſuccedit, quinque remediorum generibus ſaneſcit.

Viſtus ratione in ſumēdis, admouendis, i. educendis, & faciendis, frigidam & humidam vim ſortita. Inſtituendus porrò eſt viſtus refrigerās, & humectans, qui alteratū & inanitū corpus corrigit, & replet, prohibetq; quę ſubſtantiā alterare & euacuare poſſunt. Idcirco æger aëre libero & clementi, refrigerante & humectante fruetur, ſi febrem ſpectas, & ſiccante, ſi vlcus pulmones obſidet. Cū autem vlcus pulmones immaniter exercet, calorq; præternaturalis & febrilis comitatur, aër frigidus: ſed ad glutinādum vlcus neceſſariò ſiccus deſideratur. Veſcetur cibus concoctu facilibus uſculis euchymis, & multum ſucculentis, & gelatinis, conſumptis: inſtaurantibus, & ordeatis, panatellis, iuſculis cancrorū fluuiatiliū, & alijs eiufmodi, quę corporis maciati iacturam reſarciāt, prompteq; aſſimulantur. Inter omnia alimenta principatū tenet lac, quod horis quatuor antè pran-

pradium cū saccharo ros. sumendū est, ne vitium faciat, & tandem corrumpatur. Lac porro primum humanū & caprillum magis nutrit, asininū deterget, & bubulū calfacit, obstructionsq; protinus inuehit. Alterabuntur verò iuscula, portulaca, lactuca borragine, buglosso, hordeo excorticato, & seminib. lactucae, portulacae, & melonum. Quinetiam parabuntur hordeata ex amygdalis recentib. quippe amygdalae vterres sunt oleaginosae, calfaciunt, ventriculū subuertunt, & in bilē minimo negotio mutantur. Interim motus, vigiliarū importunitas, & animi affectus vitabuntur, quorum loco corporis quies, animi tranquillitas, & somnus moderatus substituētur. Cū autem vires elanguescunt, sapius & parca manu cibus ingerendus erit. Potus erit ptisana ex hordeo, passulis, iuiubis, sebesten, coriandro, & glycyrrhiza comparata, aut aqua cinamomi, aut vinum oligophorum aqua dilutum, in qua pimpinella incocta aut infusa fuerit. Itaque ad tempestiuam & idoneam victus rationem decernendam non solum vires, sed partes affectae, nempe cor & partium solidarum substantia exacte perpendentur, vt effluuij instauratio & reparatio fiat, quae quidem est mutatio è mino-

minori quantitate in maiorem. Etenim cum cor calida & sicca intemperie in febre hæctica conflictatur, spiritumque vitalem non nisi paucum, parcum & accensum conficiat: accidit ut hic cum sanguine calidiore efferuescens proferat calidum influens, quod in officina cordis excandescit & imminuitur, cumque ad cæterarum partium alimentum & vitam deuehitur, ob exuperantem singularum partium calorem et imbecillitatem, neutiquam probè apponi, agglutinari & assimilari potest. Cum enim calidum innatum sit substantia semper mobilis, propriaque & peculiari natura ad superficiem deferatur, & alterno motu à superficie ad centrum modice calfactum et autum moueatur tuncque hoc bene temperatum caloris et frigiditatis particeps suapte natura ad partes externas functionum obeundarum gratia inuolat, et obtemperiem minimè exhalat, alternoque motu ad resarciendam penuriam et alimentorum concoctionem intrò reuocatur. Vnde mirum non est, si in febre hæctica nimio opere accensus permuratus, et imminutus calor ille fluens, in partibus internis absumatur, et in externis partim dissipetur, immutetur et

& eadem opera non elaboretur. Siquidem intemperatum & imminutum, neque intro neq; foras naturaliter impelli potest, sed protinus permutatur & exhauritur.

Hinc admirabilis temperaturæ singularū partiū harmonia dissoluitur: præclara concoctionis æconomia interturbatur, fibræ ad appositionem, agglutinationem & assimilationem necessariæ in vëtriculo neutiquam procreantur, calor influens excandescit, confertim euolat, singularumque partium, earundem necessarium nutrimentum desideratur. Quocirca siue calidum primigenium, siue influens alterantibus, refrigerantibus & humectantibus alimentis indiget, vt quàm citissimè fieri possit periculosa vtriusque iactura reparetur. Porro in omni affectu sic authore Galeno alendus est æger, vbi facultas præceperit, & morbus non prohibuerit.

II. Causam abigentib. qua sublata morbus euestigio eximitur. In methodica enim & legitima curatione semper procurandum est, vt tota morbi radix, quæ adhuc altius inhærescit, penitus euellatur, ordineque morbus adimatur. Hinc accidit, vt morbi labes non repullulet, nullaq; symptomatū vestigia postea remaneant. Si enim, exēpli gratia, insignis animi affectus vrgētius sollicitat

licitat, omnibus rationis & orationis le-
nocinijs est demulcendus & cōpescendus
ne vniuersa sanguinis moles nimio perē ef-
feruescat, calidumq; innatum permutetur
& absumatur. Si ventriculi infirmitas sit
præcipuum huius mali seminarium, fibræ-
que ad apponendum & agglutinandum
necessariæ in chylo ritè non conficiantur,
hæc infirmitas primùm legitima victus ra-
tione vindicabitur, humores exuperantes
apparabuntur, præparati repurgabuntur,
intemperies emendabitur, & simul ventri-
culus roborabitur. Si vlcus pulmonis à ca-
tarrho contrahitur, accōmodatis primùm
subsidijs, vrpote caput siccantibus, reuel-
lentibus, cucurbitulis scapulis impositis,
suffribus & phænigmo principio spinalis
medulæ admoto sistendus venit. Interim
si humor exuperat, legitima præparatio
procuranda: deinde tempestiua purgatio
ordine tentanda est. Cùm vena aliqua pul-
monis rupta est, quicquid in pulmonibus
continetur primo loco præparādum, sub-
inde expectorandum erit. Postea vlcus pe-
culiarib. præsidijs & bechicis tergebatur,
& eo deterfo carne implebitur, tandemq;
ad cicatricem perducetur: nempè conser-
uis & syrupis tussilaginis, scabiosæ, sac-
charo rosato, tabellis è terra Lemnia, pul-

mone vulpis præparati, & suffitibus tussilaginis concinnatis, & puluere tussilaginis siccae à Dioscoride celebratis. Non quod pars solida sed talus eius vice regnatur: desideratur enim materia, facultasque formatrix, quæ veluti in fœtus formatione perfecta deest. Prætereà si vlcus alicuius partis, & ventriculi hepatis, mesenterij, vteri aut alui profluuij huius morbi soboles sit, illa prius extirpanda videtur.

- III Alterantibus & calorẽ plus æquo effervescentem obtundentib. antequam ægri in hecticam marasmodem nõ impunè decidant. Est autem alteratio qualitatis exuperantis mutatio, quæ aut intus sumptis, aut admotis remedijs ritè cõparatur, sumpta vel sunt alimẽta quorũ suprà abundè meminimus: vel medicamẽta, veluti syrupi è nymphaea, borragine, scabiosa, tussilagine, violaceus, tabellæ seu electaria trium santalorum, diatragacantum frigidum, saccharũ rosatũ, conserua buglossi, & lac asininum: alia sunt admouenda, vt epithemata cordi & hepati imponẽda, oleũ amygd. dulciũ, violaceũ, mucilagines psilij, & cydoniorũ, & balneũ, in quod primũ temperarum: deinde tepidũ, & eodẽ rēporis vestigio in frigidũ ingreditur æger, modò ab ulcere pulmonis, aut ab aliqua parte: **principe**

cipe affecta morbus non emergat. Nam testimonio Galeni balnea partibus principibus imbecillis, aut læsis suspecta esse debent. In demolliendo porrò affectu necesse est ut alteratia affectui delendo paria & æqualia sint, mutuaq; remediorū colluctatione pristinae cōstitutioni restituatur, habita semp morbi & viriū ratione. Duplex aut est intēperies: alia sanitatis, quæ paululum à media tēperie recedit: altera morbofa, quæ multū ab hac, ut in hectica defleat vberioreq; alterantiū portione indiget, ut in vernaculā constitutionē fiat regressus. Quinetiā non pauca sunt in hoc affectu sedulo perpendenda, nēpe ut sepē mutetur remedia, quæ in hecticis prōpte incalescunt, & ne astringentia cū frigidis temerè misceātur, quæ frigiditatis vim remoratur & præpediunt. Ex his liquide patet Paracelsitas novos thessalos & logodedalos in legitima huius febris, & aliorū morb. curatione omninò cecutire q̄ quintā & spirituosam essentiā quēuis affectum demere sibi falsò persuadent. Etenim si febris putrida vrget, molestā putridi & corrupti sāguinis labē refarcire nequit: quippe quinta illa ficta essentia spirituosam substātiā fulcire & reficere tantum posset, simileq; simili quādā peculiari facultate familiare esse solet.

Præterea

Error Paracelsi
sistatur

Præterea febris hectica opitulari nequit, quod hæc materia calida cordis & partiū singularum incendium refrigerare, & humidum primigenium exhaustum reparare minimè potest, vt Paracelsus falsò contendebat.

- IIII. Purgantibus sensim & partitè per epicrasim ob virium infirmitatem, humorem peccantè, qui aut stabulatur in prima corporis regione, aut circa venas, & aliquam corporis partem vberius & contumacius inhærescit, aut cùm febris putrida simul obrepit, leui pharmaco, vt semuncia vel drachmis quinque cassiæ fistularis, vel vnciae vna & dimidia mannæ electæ, vel scrupulis quatuor, vel drachma vna & dimidia rheibarbari electi infusi in decocto cichorii, endiuia, tussilaginis, scabiosæ, passularum, iuiubarum, sebestæ, thamarindorum, coriandri, hordei, & glycyrrhizæ, addito syrupo violaceo vel capillorū Veneris. Si quidem simplici affectui simplex curatio rite congruit. At cùm morbi sunt impliciti partim consentientes, partim dissentientes, quales sunt hectica & putrida ab hoc affectu auspicanda est curatio, sine quo alterius sanatio consequi nequit, aut cuius curatio alteri neutiquam incòmodat. Tamen vrgentiori affectui altero non neglecto

At, extraordinaria & illegitima quadam curatione succurrendum est, qui quamuis sit diuturnior, ob premētem necessitatem tutior & securior euadit. In legitima verò curatione febris hecticæ & putridæ eodem negotio occurrimus, sed ea lege vt purgatio hecticę neutiquam incommodet, vires non prosternat, calorē plus æquo efferuescentem inclementius non augeat, & necessariam ventriculi concoctionem non labefactet. Si obstructio delitescit, humores crassi attenuantur, & lenti iusculis & iulepis accommodatis detergētur. Interim habenda est semper virium ratio, studioseq; prouidendum est, an hæ sint vegetæ, vel deteriores, eademque opera pars princeps affecta nempè cor roboretur, ne huius vis elanguescat, & dissipetur. Cæterum qualitas medicamenti pro natura morbi, quantitas pro magnitudine & viribus ægrotantis semper decernetur, in hocq; plurimus erit medicus, vt bellè respondeat alius.

Symptomata delentibus, quæ si imma-
niter excruciant, vires prosternūt, & necessariam ventriculi functionem conuellunt, ad eorum curationem præcipiti celeritate properandum est morbo paulisper intermisso, nō quatenus symptomata, sed quatenus periculosum viriū & vitę discrimen

impendet. Nā morbi in partibus, causæ in humorib. symptomata in functionib. resident, quæ ob vrgentē necessitatem certa & peculiarια exposcunt remedia. Quamuis depto morbo symptomata protinus & simul euanesçūt. Id genus sunt alui profluuiū, dolor, sitis, deiecta appetentia, animi deliquiū, & vigilia. Cū emergit immoderatum & molestū alui profluuiū, cum deiecta appetentia vētricus firmandus & roborandus erit, sumptis cibis euchymis gelatinis, pressis, consumptis, instauratibus cortice citri conditi, myrobalanis cōditis, diamargarito frigido, puluere coralli rubri, cornu cerui, & terræ lemnia, nec non admotis, oleo mastichino, myrtillorū cum puluere rosarum, & nucis moschatae, sacculis, & epithematib. peculiarib. Si verò causas trahit à destillatione cerebri primū fluxioni, deinde ventriculo roborando diligēter studendū erit. Cum dolor vrget, anodinis & dolorē demulcentib. opitulandum est. Cū fatigat sitis sitim minuentib. & fallentibus, vt syrupo violaceo, è limonibus occurrendum erit. Si animi deliquium irrepit pro varia causarum occursatione propulsabitur, vtpote in restauratione spirituum & copiosiore euacuatione fulciantur, & reficiantur vires, instau-

instaurantibus, gelatinis, pressis, iuscu-
lis, vino, odoribus suauibus & corrobo-
rantibus, sicuti pulueribus, margarita-
rum splendorum, rasuræ eboris, dia-
margariti frigidi, ligni aloes, cornu v-
nicornis, seminum acetosæ, citri, con-
fectione alkermes, syrupis è limonibus,
& acetositate citri.

Facies porrò inspergetur aqua rosarum,
nisi adsit molestum alui profluuium. In
resolutis spiritibus abstinendum est à fri-
ctione. Si oriatur à copia & crassitie, hu-
morū frictiones mirificè proderunt, haud
aliter quàm si maligni humores hoc vi-
tium pepererunt, alexipharmaca & fri-
ctiones vniuersi corporis decernentur.

Somnus conciliabitur, syrupis è papaue-
re, & nymphæa, è violis, diacodio sumptis
cū cocleari vel aqua lactucæ, addito simul
scrupulo dimidio diamargariti frigidi. Ad
hunc & eundem scopum frontalia & flo-
ribus nymphææ, violarum, oleo rosato,
& aceto componuntur. Græci ad eundem
vsus lotiones pedū & manuū præscribūt.
In his porrò administrandis habenda est ad
vnguē temperamenti, humoris, & ætatis
ratio. Nam humidi, & pituitosi, & senes,
qui à pristino habitu, longius recedunt,
cū eodem morbo conflictantur, validiora

refrigerantia, sed pauciora & frequentius repetita postulant. Vbi autem marasmus anxie torquet, qui excitatur cum partes solidæ, membranosæ, & fibrosæ simul exarescunt, nullo præsidij genere refarciuntur, in hocq; incumbendum est, si aliquis spei relinquitur locus, ut cibis euchymis & frequentius sumptis tantum reficiantur egri. Interim medicum prudentem & prouidum in hoc se gerere sic decet, ut celerem & festum exitum necessarijs denunciet. Sequitur ordine curatio febrium, quæ in putrido humore resident.

De curatione febris continuæ. Cap. vi.

Febbris continuæ curatio septem præsidiorum capitibus continetur. Victus ratione, quæ pro varia affectus specie, diuersa temporis conditione, & viribus ægrotantis variè decernitur.

- i. Cautio enim adhibenda est, ut in febre colliquescente, causo, & lipyria victus, multum refrigerans & humectans instituatur: cuius generis censentur iuscula lactucæ, oxalidis, endiuia, & portulacæ, addito seminum melonum, lactucæ, & papaueris albi nodulo: quibus etiam succi limonum, citri & mali punici rite admiscuntur. Hoc nomine Hippocrates præscribit in febre arden-

ardente aquam coctam, & in febre colli-
quente ptisanæ cremorem: mediocris po-
tus est salutaris in omni morbo liberalior
noxius, qui naturam à suo munere auocat,
ptisana parari potest ex hordeo decocto,
feminibus coriandri, lactucæ, cucumeris,
& radicis glyccyrrhizæ, cui tantillum san-
tali citrini simul misceri poterit. In febre
affode ab humore acri & bilioso tunicis
ventriculi infarcto contracta, hordeata ad
detergendum non ineptè exhibebuntur. In
cardiaca febre ex maligno vapore genita
femina citri & acetosæ iusculis & ptisanæ
permista eximiè conferre poterunt. In fe-
bre quotidiana continua cibus hume-
ctans, sed aliqua ex parte incidens & ex-
tenuans videtur esse porrigendus, vt pa-
natella & malsa, quam minimè improba-
runt Græci. Cæterum legitima & oppor-
tuna viuendi lex à natura & vigore fe-
bris, ægrotantisque viribus est decernen-
da. Quò enim acutior & breuior est mor-
bus, eò tenuior victus ratio est præscri-
benda, præsertim vbi vires non reclamēt.
Etenim cum elanguescunt vires, paulò ple-
nior est exhibendus victus, omniq; ope e-
nitendum & arte sic opitulandum est, vt
fulciantur vires, sine quarum obsequio ni-
hil nisi frustra moliri potest medicus. Por-

D

rò quantitas sumetur ex natura & vehemētia febris, viribus, & ætate ægrotantis, & quatuor morbi temporibus. Siquidem in principio tenuis victus: in incremento tenuior: in vigore tenuissimus exhibendus venit. Vigor enim per accidens indicat tēpestiuam victus rationem; per seq; prohibet tunc nihil porrigendum esse, ne natura in sæuiore affectus excandescantia à necessario concoctionis & excretionis munere reuocetur. Interim in morbis acutis, tenuis: in peracutis, tenuior: in extreme peracutis, tenuissimus victus est offerendus. Porro satietas post crīsim vt testatur historia de muliere morbo defuncta, quæ liberalius cēnata, vitabitur post interijt.

11. Minuētibus humorē in prima corporis regione, ne sordescens humorū colluies in locū sanguinis vacuādi raptim traijciatur, & ne futuro præparationis negotio in totā corporis molē sparsim effundatur, sæuāq; symptomata infligat. Ad hanc rē accommodantur blanda medicamenta, vt semūcia vel 3. 6. cassiæ in bolo sumptæ vel mānæ electæ 3. 1. & dimidia, quæ etiā dissoluantur vel in sero lactis, & decocto cichorii, oxalidis, hordei, seminum melonū, prunorum, thamarindorum pinguium, & triū florum cardiacorum cum syrupo violaceo
vel

vel ex infusione rosarū, vel infuso rheibar-
bari electi: quæ omnia benigna medicamē-
ta ignorabant Græci, horumq; loco ellebo-
ro, peplio, & hiera picra utebantur. Cly-
steres ad eundem vsum comparari pote-
rūt ex cassia fistulari, saccharo rubro, oleo
violaceo, & decocto quatuor remollientiū
& lactucæ. Tamen à leuiorib. nō est auspi-
candum, cū brevis est morbi historia &
cū natura statim erit in procinctu.

Vacuatione quæ ex magnis vasis humo-
rem peccantem febris continuæ sobolem
prolicat, omnibusque affectibus biliosis &
inflammationibus præsentissimum cense-
tur esse remedium, præcipuè vbi plethora
comitatur. Natura igitur seu magnitudo
febris & viriū robur sanguinis missionem
suadent, quæ in principio administrabitur
antequā vitiosa putredinis labes inuale-
cat & facultatum attritarum firmitas elan-
guescat, ne etiam pharmacū postea sumen-
dum turgentes humores impellat.

In plethora porro ad vasa, ad lypothy-
miam vsq; sanguinē detrahunt Græci, nisi
viriū infirmitas dissuadeat. In plethora ve-
rò ad vires paulatim parcius & partitè san-
guis effunderetur. Ceterū quantitas sangui-
nis, ex primarijs indicationib. utpote natu-
ra & vehemētia febris, et egrotātis viribus

nec nō secundarijs veluti tēperamento & corporis habitu, coindicationibusq; simul perpenſis, nimirum etate, cœli ſtatu, victus ratione præcedente, immodica vel ſupreſſa vacuatione æſtimabitur. Adde quod futura actio læſa, præſens, & futura temporis conſtitutio in hoc negotio minimè prætermittentur. Non verendum equidē eſt cum Arabibus, parcendum eſſe ſanguinis miſſioni, ne eiſdem moles nimio opere efferueſcat. Nam cū vena eliditur, omnes humores præcipuè exaperantes conſertim dimanant, naturaꝗ onere humoris peccantis morbum committentis leuata reliquias minore incommodo expeditius euincet, leuiorꝗ efferueſcentiæ occaſio intus deliteſcens ſubſequetur. Itaq; in bilioſa plethora ob refrigeriū & futuram caloris extinctionē vberior: in pituitoſa ob futuram cruditatē parcior detrahetur ſanguis: ambigit verò melancholica. Quòd ad vtendi modum ſpectat pro varia febris natura & partium affectarum conditione diuerſa pertundetur vena, vt interna dextri brachij ex vena caua & hepate ſiniſtri cubiti interna, ex liene promptius & validius detrahit. Quocirca in febris bilioſis interna dextri brachij: in melancholicis ſiniſtri cubiti tutò & citò ſecabitur.

Præ-

Præparatione, quæ duplex est: altera corporis, in qua laxatis & patentibus corporis meatibus, idem alimentorum & medicamentorum beneficio præparatur, ne medicamento cursus remoretur. Altera est humorum, qui nisi ritè sint apparati medicamento minimè cedunt, & in purgationis negotio graua symptomata inuehunt. Et enim tres censentur in corpore alterationes: alia naturalis, pepsis dicta perfectio à calido, naturali elixationi similis: alia est contra naturam omninò putrida, quæ nullo negotio concoqui potest, sed alteratione & excretionem indiget. Tertia est media pepasmos dicta, semi putridorum coctio, quæ, teste Galeno, bifariam sufficitur. Siquidem aut crudi sunt humores, veluti pituita acida & dulcis, cuius portio ita edomatur, vt in substantiam alimenti conuertatur: alia est admodum putrida, quæ euincitur & maturatur à natura, medicamentorumque beneficio ad excretionem aptior redditur. Id genus sunt vtrique bilis & ichores, quæ cum à natura edomantur, concocta quodammodo dicuntur: quamuis nihil in nostram substantiam faceffere possit. Idcirco humores in prima & secunda corporis regione congesti apparandi erunt iusculis & sy-

rupis accōmodatis, vt exempli gratia: si bilis exuperat, commodè instituentur iuscula ex borragine, buglosso, endiuia, oxalide addendo succum citri & mali arantij. Syrupi etiā è cichorio simplici, ex acetositate citri, violacei, singulorū vncia dimidia, aquæ stillatitiæ, oxalidis, buglosi, & cichorij, singulorum vncia vna simul miscantur, & sumantur cum tabella vna diamargariti frigidi. Si humor pituitosus simul reconditur, in eodem decocto addentur radices asparagi, graminis, & folia agrimonie scolopendrie & lupuli. Cū verò humor malignus, vt in lipyria negotium facit, addentur buglossus, viola, nymphaea, succus mali citrij, cotonei, & semen oxalidis, aut liquores stillatitij, melissæ et tormentillæ. Semper equidem habenda videtur esse ratio maligni humoris & partis affectæ, præsertim principis, quæ dignitate & præstantia vniuersam corporis œconomiam moderatur. Quamobrem humores crassi attenuandi, lenti detergendi, et duri molliendi veniunt. Tenues verò concoquendi ad expeditiorem excretionem non censentur, vt in sputi expectoratione contra mentem Arabum, qui propius et per se è corpore effluunt, nisi suapte natura acres extiterint, qui tunc sunt demul-

CONSULTATIONIBVS.

51

demulcendi, ne excernendo molestiam ad-
ferant. Græci oximelite & mellitis ob pe-
nuriâ & ignorantiam sacchari utebatur:
nunc Arabum more syrupum acetosum,
oxisaccharum & syrupos accommodatos
cum saccharoq; comparatos, in febribus
continuis cōmodius instituimus. Quæ cū
ita sint legitima præparationis qualitas, p
natura humoris: limitatio quantitas, pro
copia, vsus modus, pro parte affecta, humo-
ris situ, & motu in principio tutò, citò &
iucundè procurabitur. Galenus præpatio-
nem contra suorum aduersariorum opi-
nionem in suis libris vbique celebrat, quâ
breuitatis gratia libr. vndecimo, Method.
prætermisisse videtur in curatione febris
putridæ.

Purgantibus humorem sensim appara-
tum in morbo salutari, qui p humoris na- v.
tura & situ per epicrasim & partitè apparē
tibus signis concoctionis expurgatur. Nā
vt triplex statuitur concoctio, nempè ob-
scura, manifesta & perfecta: sic triplex de-
cernenda erit purgatio his respondens, ni-
mirū parca, moderata & valida, præsertim
cū putredinis labes secundam corporis
regionem obsidet. Cū verò dubius & pe-
riculosus est affectus, aut signa concoctio-
nis, quæ nec sunt, nec aderunt, ad pur-

gationem statim properandum est, vbi obferitatem affectus, & atrocitatem symptomatum deperdendæ salutis adest suspicio. Nam humor maligna qualitate præsternens, vberiore copia premens & turgens, partes principes obsidens & doloris atrocitate excrucians, in quavis corporis regione ante concoctionem (quæ frustra ob inopinatum exitium expectaretur) initio deriuandus & profligandus est. Itaque si bilis repurganda est drachma vna & dimidia, vel duabus rheibarbari, vel semuncia myrobalanorum flauarum infusis in decocto cichorii, oxalidis, prunorum, thamarindorum pinguium, quatuor seminum frigidorum maiorum, & trium florum cardiacorum: expressioni colatæ addentur electarij è succo rosarum pro exuperati copia & virium firmitate scrupuli quatuor, aut drachma vna & dimidia, syrupi ex infusione rosarum, vncia vna, trochiscorum è caphura scrupulus dimidijs: aut dissoluentur drachmæ sex cassiæ fistularis, aut vnciæ duæ manæ electæ. Pro natura enim humoris exuperantis peculiare remedij genus, pro magnitudine affectus & humoris certa quantitas, pro humoris motu & situ vtendi modus perpetuo instituetur, sed ea lege vt in ancipiti morbo medicamentum
vali-

validum præscribatur, ne mitiore medicamento & diuturniore mora totius corporis structura corruat. Cōtingit enim vt plurimum morbum blandioribus pharmacis efferuescere, viresque paulatim labascere. Interim in hoc totus erit medicus, vt purget quantum vires ferunt, & quamdiu & quousque reliquæ humorum supersint. Præterea vtendi modus studiose est obseruandus, qui humoris semel, vel pluries purgandi opportunitatem, loci commoditatem, & ordinem regionis primæ, deinde secundæ, postremo tertiæ exhauriendæ, continet. Medicamentū verò naturæ corporis & humoris qualitate vel quantitate semper debet esse analogum.

Sudores & vrinas mouentibus post integram concoctionem, præsertim cum ociosa est natura. Vt enim medici transactio sæuiore status tempore post euictam & concoctam materiā tutò pharmacum propinant, cum est ignaua natura: sic testimonijs Græcorum & Arabum post signa concoctionis, digestio legitimè instituitur, quæ quidem duplex censetur: Nam alia est alimenti, anadosis dicta, quæ à facultate attractrice emergit. Altera est excrementorum, quæ duplex iudicatur, vna sensibilis, diacrisis dicta, in qua vrine, sudores, & aliæ

excretiones profunduntur: altera est insensibilis, diaphorisis nuncupata, in qua per insensibilem transpiratum ex toto corporis habitu exhalant excrementa. Sudores igitur & urinae mouebuntur syrupo acetoso simplicis, capilli veneris, & è limonibus, iusculis asparagi, graminis, foliorum borraginis, buglossi, & seminum melonum simul perfuso citri succo. Quantitas pro natura & situ humoris instituetur. Præterea medicus eò usque moliri debet omne euacuationis genus ut tota morbi soboles euellatur, ne remanentibus humorum reliquijs recidiuus affectus succrescat. Græci & Arabes post signa concoctionis, balneum aquæ frigidae non improbant, cuius ope sudores, & urinae facilius cicerentur. Si natura per se id negotij aggrediatur, totum huic committendum est. Quod enim natura per se præstabit, frustra medicina tentabit.

[VII.] Alterantibus & roborantibus præsertim in declinatione morbi, corpore probe repurgato cordi & hepati admouendis. Siquidem ex febrili incendio empyreuma & imbecillitas perpetuò consequuntur: quæ quidem ut plurimum in eundem affectum, aut priore deteriorem præcipitant ægrum.

Vnde mirum non est, si hoc seculo non pauci

pauci ægri ob neglectum horundem præ-
fidiorum vsum in seuiorem affectum rela-
buntur, & miserè excruciantur, vixq; tan-
dem redimantur. Quocirca eò spectabit
medici opera, vt post febrem continuam,
siue ardentem, siue colliquescentem, siue
cardiacam, admoueantur cordi & hepati
epithemata refrigerantia & roborantia, in
declinatione morbi, aut in statu, cum ni-
miopere exardescit, & sæuius efferatur
affectus. Parabitur autem epithema, cordi
admouendum ex aquis stillatitijs, bu-
glossi, rosarum, pimpinellæ, oxalidis
& nymphææ, singulorum vncijs duabus,
addendo pulueres diamargariti frigidi,
coralli rubri, santali citrini, singulorum
drachmam vnam, et fragmentorum preci-
osorum, scrupulum vnum, croci, tro-
chiscorum è caphura singulorum scrupu-
lum dimidium, aceti vnciam dimidiam,
non dissimile ex decocto eorundem sim-
plicium componitur.

Comparabitur etiã epithema hepati im-
ponendum ex aquis rosarũ, cichorij, oxali-
dis, singulorum ʒ. 4. addendo santalorum,
spodij, singulorum ʒ. 1. spicenardi scrupu-
lum dimidium. Antiqui hydreleum ad-
moueabant, nunc recentiores aquam stil-
latitiam rosarum, oleum violaceum, &

acetum simul perfundunt & adhibent. Quinetiam ad hunc & eundem scopum imponitur epithema genitalibus, ex aquis rosarum, plantaginis, vino & aceto confectum. Præterea exhibebitur conditum ad robur & refrigeriū ex cōseruis nymphææ, buglossi & oxalidis, admiscēdo pulueres diamargariti frigidi, & fragmentorum cōmunium. Qua in re Græcis Arabes sunt locupletiores, qui roboris & refrigerij gratia, ob suaues sacchari delitias, sacchara, seu conseruas, condita, & tabellas ingeniosè excogitarunt. Græci olim succum rosarum propinabant, nunc posterī syrupos peculiares, vt è limonibus, & è granatis, & iuscula lactucæ, oxalidis & portulacæ cum succo limonum foelicius porrigunt. Igitur qualitas alterantium & roborantium ex specie affectus, partis quæ affectæ conditione: quantitas ex vehementia, & sæuitia præcedentis affectus spectabitur. Semper equidem mala qualitas tollenda, corpus imbecillum roborandum, & quod absumtum est, restaurandum venit.

VIII.

Symptomata emendantibus, quibus prætinus extraordinaria curatione occurrendum est, si ab horum feritate vitæ discriminē impendet, non quòd morbus, & eius causæ seminaria demantur, sed quòd funestā horum

morum sæuitiam leuant. Actio enim læsa
ex morbo, excrementorum vitium, & sim-
plex corporis affectus ex actionis offensi-
one primordia gradatim acceperunt.

Cùm molesta vigiliarum importunitas
egrum fatigat, somnus accersendus erit,
yrupi è nymphæa, aut è papauere fescun-
dia, stillatitij liquoris lactucę vncijs tribus
cum scrupulo dimidio diamargariti frigi-
li, quæ mista appetente sôni tēpore exhi-
debuntur, vel philonis antidorus institue-
tur, si æger sit robustus. Quippe, teste Aui-
cenna, opiū imbecillis & senibus est susce-
ptum. Quinetiā admouebuntur carpis ma-
nuum, & fronti vnguentū populeum, & o-
leum rosarum cum aceto, vel capita papa-
uerum in albumine oui dissoluta, vel flo-
res papaueris, & nymphæę simul permisti.
Gręci commendant lotiones pedū & ma-
nuum, quæ parantur ex decocto folio-
rum lactucę, maluę, violarię, cucurbitę,
florum nymphęę, rosarum & papaueris al-
bi. Somnus etiā præcipuè conciliandus
venit, qui delirium compescit, & sitim à
siccitate profectam demulcet. Immodera-
tus verò à copioso humore cerebrum per-
fundente contractus, suspectus esse solet,
qui succo fœniculi cum aceto cocto, & o-
dorato excitabitur.

Dolor verò capitis propulsabitur oxirò-
dino fronti admoto, vel frontali ex farina
hordei macerata in succo betonicæ, & ser-
pilli, vel decocto florum betonicæ, came-
meli, rosarum, & violarum fronti impo-
sito. Celsus decernit rosas in aceto mace-
ratas. Delirium abigitur repellentibus ce-
rebro admotis, somnum conciliantibus,
frictionibus, lotionibus pedum & ma-
num, syrupis, & iusculis refrigeranti-
bus, efferuescentes vapores frænantibus.
Catarrhus compescendus est peculiari vi-
ctus ratione, reuellentibus vt frictionib. &
cucurbitulis scapulis admotis, errhinis &
catarrhum sistentibus, præsertim vbi tuf-
sis aspera, præceps suffocationis periculū,
vigiliæ & excoariatio ægrum exercent. In-
terim cautio adhibenda est, repellentia,
non nisi cum religione fronti adhibenda
esse, cum catarrhus multum vrget, & mul-
ta in cerebrum confluit materia.

Cum sitis sollicitat syrupi è limonibus
violaceus & acetosus simplex cum aqua
cocta, vel prisana, conserua symphiti &
nymphææ exhibita, & portulaca in ore
terenta, haud dubiè opitulantur. Si suffo-
cans incendium & intolerabilis corporis
iactatio ægrum excruciant, refrigerantia
& humectantia sumpta & admota, & sari-
guis

uinis missio, si nihil dissuadeat, non
 arum conferunt. Si dolor renum & ca-
 or obrepunt, cerato santalino, & oleo
 iolaceo simul perfuso succurrendum e-
 it. Si icterus suboritur, obstructio-
 em tollentibus, sudores & urinas mo-
 entibus, lotionibus & fotibus florum
 amæmeli, melilori, & anethi obisten-
 um erit. Sudores vniuersales die de-
 retorio erumpentes, febrem arcentes,
 ymptomata minuentes, & à quibus æ-
 er bene se habet, & qui facile ferun-
 ur, naturæ sunt relinquendi, nec sup-
 rimendi quoad pulsus apparebit ma-
 nus & mollis.

Si verò immoderatus eruptionem fa-
 unt, pulsusque euadit languidior, pro-
 iribus excernentur, ne ob insignem eua-
 nationem, & irruentem virium infirmi-
 atem, ad exitium inopinatum præcipitèr.
 qui subsistunt, aut à copia, aut à crassitie
 umorum proritandi erunt syrupis è li-
 onibus, capilli Veneris, & acetosi simi-
 licis cum ptisana, vel decocto graminis
 & asparagi. Si dysenteria ægrum offendit,
 & febre succedat, victus ratio peculiaris p-
 umore peccante instituetur, qui rheobar-
 baro & myrobalanis expurgabitur. Au-
 tennas autem verè atque sapienter pro-

didit, profluuiū profluuiū causam abscin-
dendo curari, quod videtur cōfirmare Ga-
lenus 24. Aphorif. lib. 4. Præterea clysteres
primū lenientes: deinde detergentes: po-
stea cicatricem inducentes sunt præscri-
bendi. Si profluuium vires prostermit, nul-
læque humorum peccantium reliquæ su-
persunt, constringendum, vrinasque & su-
dores cientibus, reuellendum est. Interim
in magna acrimonia humorum & viribus
validis narcotica non sunt omnino negli-
genda. At in materia frigida & crassa, du-
bia esse solent. Inter præsentissima reme-
dia probatur à Galeno libr. 4. de articulis
epithema, & quoduis præsidium hepar ro-
borans. Si profluuium sit pestilens, robo-
rātibus, & alexipharmacis expugnabitur.

De curatione febris ex cruditate.

CAPVT VII.

CVM febris ex cruditate sit anceps &
dubius morbus, partim ob exuperan-
tem humorum copiam obruens, & ob ma-
lignam humorum perniciem vt plurimū
prosterbens, præcipuè cum à cibis corru-
ptis primordia accepit, à naturaque euin-
ci non potuit, peculiare & tenuem victus
rationem exposcit. Magnus autem & an-
ceps est morbus ex se, qui aut partes prin-
cipales

cipes, aut à corde non remoras, aut acutius sensu insignitas occupat, vires conuellit, vtrumq; calidum fixum, & influens obterit. Quinetiam magnus ratione causæ nuncupatur, qui ob exuperantem humorum sarcinam omnes partes nobiles & ignobiles obruit, & ratione symptomatum fûctiones vitæ necessarias labefactat. Tamen æger non est vsque adeò deperditæ sanitatis, quin adhuc aliquis curationi relinquatur locus, quæ octo remediorum capitibus comprehenditur.

Victus ratione tenuante, quæ pro vberiore cruditatis prouentu humorē crassum & crudum attenuat, sensimq; corpus tanto onere cōfertum leuat, simulq; vires fult. Eò igitur dirigetur consilium, vt viriū ratio habeatur, harumq; subsidio sensim & pedetentim humorum impuritas absumatur, siue in prima, siue in secunda, siue in tertia corporis regione delitescat. Vires porro languidæ, vel integræ internoscuntur functionibus animalibus, nempe sensuum & motus firmitudine, aut infirmitate, vitalibus vt pulsu magno, vehementi, aut paruo, & languido, & naturalibus, nempe signis coctionis vel cruditatis. Itaque si pulsus est magnus, satis vehemens & laudabilis, aliquodque concoctionis signum

E

in vrinis se prodat, certissimum est argumentum naturam victricem esse, tenuissimoque victu fulciri posse. Cum verò pulsus apparet parvus, languidus, vrinaque omninò confusa permanet, certò colligendum est naturam, aut admodum oppressam, aut prostratam esse. Quocirca primarium artis votum erit naturam fauentem habere, eiusque motum & progressum imitari, vt æger legitimis & tempestiuis viuendi legibus redimatur. Si enim vires non admodum fatiscunt, parciore victus ratione fruetur, à concoctionisque officio minimè reuocabitur natura. Instaurantur autem panatella, & iuscula pulli, capi cum thymo, hyssopo, petroselino, buglossò, asparago, & ciceribus rubris. Cum vires infringuntur gelatinæ, consumpta, instaurantia, & omnes cibi euchimi parca manu multum nutriendos conferre poterunt. Potus erit aqua cinamomi, aut hydromel, in quo incoquantur eupatorium, betonica, gramin, hyssopus, & stæch. Post victoriam morbi, prouidendum est, an empvrea, an siccitas, an macies, an imbecillitas, an humor excrementitius adsint: quibus statim succurrendum est ea lege, vt quæ longo tempore extenuata sint, lentè, quæ breui

breui, breuiter reficiantur. Porro hoc
in loco silentio non est prætereundum,
rudum, autore Galeno Comment. secun-
do in libro de ratione victus in morbis a-
cutis cap. quadragesimo quarto, manere
morbum ob inædiam longam vel intem-
pestiuam cibi oblationem.

Minuentibus humoris illuuiem in ve-
nis meseraicis congestam, aut catapotijs
ex hiera, aut diaphœnici, vel electarij in-
li vncia dimidia, vel drachmis tribus, cum
syropi, capilli Veneris drachmis sex, hy-
dromelite, vel decocto pectorali in quo
bullierint polipodi quercini, follicu-
lorum fennæ cum aniso, singulorum dra-
chmæ duæ. Non parum etiam opitula-
buntur clisteres ex decocto carminatiuo,
& remollientium, addendo diaphœnici,
hieræ picræ singulorum vnciam dimidiâ,
nellis rosacei vnciam vnam, olei lilio-
rum & camæmeli singulorum fescûciam.
Iteni in cûm ingens humorum crudorum
sentina calorem innatum suffocat, protu-
sus exaurienda venit, antequam natu-
ra tanta mole obruatur, ne etiam exupe-
rans humorum fœnus in prima corporis
regione cumulatiùs retentum, apparan-
do in secundam deuehatur, affectumque
reminet.

Præparantibus humorem crudum concoquendo, lentum detergendo, crassum attenuando, durum molliendo, & meatus constrictos aperiendo. Primum crudus humor concoquendus est medicamentis, calori nativo non admodum imparibus: id genus sunt syrupi à mentha, & à corticibus citri qui calore temperato nostrum recreando, & augendo concoctionem iuvant, & resoluendo incrassant. Duæ equidem censentur causæ genitrices crassitie, nempe calor & frigus. Quæ enim à frigore & astrictione concreta sunt, crassa incidenda, & lenta detergenda se offerunt. Cuius ordine sunt oximel simplex, mel rosaceum, syrupi à duabus & quinque radicibus, & à bizantijs, aquæ fœniculi, hyssopi, eupatorii, hydromel in quo decoxerunt radices asparagi, graminis, polipodi quercini, folia scolopendriæ, capillarium, et chamædrios, & iuscula petroselini, hyssopi, thymi, buglossi, capparorum, & passularum corinthiarum seu damascenarum. Dosis verò syruporum est, ut plurimum aut sescunciæ, aut unciam duarum, & decocti trium unciam. Præterea non solum sumptis, sed etiam admotis rite apparatus humores sacculis hipochondrijs, & ventri admouendis, qui concinnabuntur

tur ex radicibus asari, brionię, corticum capparorum, thamaricis, folijs absynthij, chamędrios, eupatorij, fumarie, peucedani, centauri minoris, floribus camęmeli, meliloti, genistę, saluie, & iunci odorati: quibus addi poterunt semina agni casti, & fęnigręci. Interim eò spectabit opera, vt perpetuò à leuioribus auspicetur, sensimque obstructio funditus extirpetur, quę impeditam transpirationem, prępedita transpiratio putredinem, putredo febrem sensim ingenerat.

Purgantibus humorē pręparatum, qui **iv.** febrem fouet, & per epicrasim, vt natura aliqua humoris portione leuata in reliquias expeditius incumbat. Medicamentum blandum et lene exhibendum erit, ne diarrhęa, aut cholera morbus statim irruat. Infundatur autem rheibarbary electi scrupuli quatuor, agarici trochiscati scrupuli duo, cinamomi optimi scrupulus vnus in decocto pectorali, in quo ebulliāt folliculorum senne cum aniso, vel caryophilis drachmę duę, & syrupi capilli Veneris drachmę sex simul perfundantur. Si vires non reclamarent, diaphęnici drachma vna dissolui poterit. Quocirca quantitas purgationis proportionem magnitudine, viribus ægrotantis, constitutione corporis, humoris & cęli, vsus

modus pro affecta parte nec non pro humoris qualitate, quãtitate & situ decerneretur, ne pharmaco parum dextre exhibito æger cum morbo exterminetur.

v. Vacuantibus nimirum sanguinis missione cum fœdum morbi seminarium secundam corporis regionem occupat, plethorãq; ad vires, & ad vasa opprimit. Nã sicuti cacochimiæ purgatio, sic plethorę sanguinis missio congruit, quæ in hoc affectu nimio opere vrget. Itaq; sanguis mittendus cõsetur, sed ob periculosa cruditatis labem minori copia exhaurietur, semperq; viriũ ratio habeatur. Siquidẽ pro magnitudine morbi, & virib. ægrotantis, tanquã primarijs indicationib. sanguis parcior, vel vberior detrahetur. Quod verò Gal. in febre pituitosa, & epiala cruditatis ratione venã non pertũdit, hoc p̃stat, cum non sollicitat plethora, & ob virium imbecillitatem, in febre syncopali neq; purgat, neq; euacuat, sed tantũ frictionem adhibet. Non enim eodem authore sanguis detrahendus est in illis, in quibus in alium humorem insigni mutatione conuersus fuerit. Quod reliqui spiritus quibus fulciuntur vires, simul euanescent. Cum verò vires adsunt validæ, Arabes & Græci, recentiores in febre syncopali à pituitoso humore genita, ad humores

.3. in libr.
id. c. 48.

mores præparantia blanda pharmaca, & frictiones non temerè confugiunt. Si ventriculus & venæ meseraicæ crudorum humorū prouentu sordescunt, medicinā potius quàm sanguinis missione conferre apparet. Quandoquidē medicamentū caco-chimiae expurgandæ accōmodatū, ex prima corporis regione exuperans, cruditatis fœnus faciliè extrudet. At sanguinis missio cō non pertingit, hancq; cruditatis sentinā ad magna vasa attraheret, affectumq; priorē deteriorem infligeret.

Vrinas & sudores mouentib. vt humor, q v i. in secunda corporis regione reconditur, p loca conuenientia deriuetur, vtpote iusculis graminis, asparagi, & petroselini, auc hydromelite, in q flores stœchados, & betonicae, & hæc simplicia medicamenta cōmemorata simul incoquētūr. Interim omne studiū in hoc collocabitur, vt excrementa fuliginosa per corporis habitum deuoluta, per insensilem transpiratum, opportuna frictionum ope excernantur.

Roborantib. vt conseruis betonicae, capillorum Veneris, confectioe alkermes, v i i. cortice citri conditi, tabellis electarij aromatici rosati, diagalanga, & dianiso, & oleo nucis moschate, quo inūgetur vētriculus. Danda semper erit opera, vt ventri-

culi & hepatis ratio habeatur, ne ventriculi attritio suboriat, in qua chylus ante excretionem in pituitam faceſcit, atrociorque ſymptomata profert: quorum meminit Galenus in lib. de præſagitione ex pulſibus. In hoc enim affectu ventriculū poſt pedes calefactos oleo nardino inungit, vinumque generoſum propinat. Nunc recētioreſ medici puluerem galangæ, aut pipēris cum pane azimo inuolutum, & aqua vini ſtillatitia cōpoſita tutò & incundè porrigunt. Parabuntur linimenta pro regione ventriculi ex oleo nucis moſchatae, & pro liene oleis è genifta, & è capparibus.

IIx. Symptomata delentibus, vt lienteriam, quæ ſi contrahatur ab imbecillitate, alteratricis & retentricis facultatis corroborantibus præſidijs, & aſtringentibus vtendum erit. Si cæliaca affectio negotium faceſcit, & ab obſtructione venarum meſaricarum proficiſcatur, primo loco humores erunt minuendi, ſenſim præparandi, & euacuandi. Quando ab imbecillitate hepatis cauſas trahit, roborabitur æger ſumptis & admotis, intemperiesq; ſimul obliterabitur, ne nouus humor ſuccreſcat. Cū diarrhœa fatigat, & eſt critica & perfectæ, naturæ relinquenda venit, viresque interim fulciatur, & reſciantur. Si imper-

fe ſta

fecta obrepit, iuuanda est, humorq; peccans per epicrasim deriuandus est. Pro ceteris causis aliâs suo loco curatio instituetur. Haftenus febrium curatione perstrinxi, quarum causae in vniuerso corpore, praeterim in mole sanguinis resident. Nunc perscrutandae veniunt febres symptomatice, quae in partis alicuius inflammatione, aut humore circa aliquam partem inarcto, aut corruptela eiusdem consistunt.

De Curatione febrium symptomatarum.

CAPVT VIII.

FEbris symptomatica ab inflammatione genita, primo loco excutienda est, quae octo remediorum capitibus oblitterabitur.

Victus ratione tenui, refrigerante & i. humectante, fluxionemque prohibente, quae pro magnitudine morbi quatuor eiusdem temporibus, & viribus aegrotantis variè praescribitur. Quod enim acutior & sauior est inflammatio, eò tenuior viuendi lex decerneretur. Quinetiam pro varijs quatuor morbi temporum periodis diuersa victus ratio decernitur. In febrium enim essentialium principijs tenuis victus, in incremento tenuior, in vigore tenuissimus

exhibetur: quod in vigore iudiciũ expetatur, tuncq; natura ab vrgentiore concoquendorum, & expellendorum humorum negotio non est perperam distrahenda. Verũ in febribus symptomaticis alio modo cibus porrigẽdus est, nimirum in principio tenuissimus, vt partes singulę humorum superfluũ auidius retineant, præcipitem & effoeratum fluxionis impetũ coerceant, inflamationemq; febris symptomaticę sobolem imminuat. Fluxioni equidẽ admissæ, quàm admissuræ ægrius occurratur. Igitur in principio huius febris symptomaticę tenuissimus victus porrigẽdus venit, vt pruna elixa, hordeata: deinde in incremento & vigore, iuscula, panatellæ ex pane loto confectæ, gelatinæ, & instaurantia, vbi vires elanguescunt & nimio perẽ atteruntur. Cũ enim vires fatiscunt, paulò pleniori victu videntur esse reficiẽdi ægri. Interim habenda est ratio partis affectæ, quam inflammatio obsidet. Etenim si pars princeps, aut huic finitima, aut publicum munus obtinens, aut sensu acutior prædita, victus tenuior parũ tutus est, sed paulò plenior instituendus, simulque protinus ad roborantia festinandum est. Sunt equidem partes principes, iudicio Arabum, roborandæ & conseruandæ, quæ digni-

dignitate præstant, vniuersum corpus moderantur, ex earūq; insigni offensione præceps, & inopinata vitæ euersio imminet. Aliæ publicū munus corpori sustinendo necessarium obtinuerunt, vt ventriculus: aliæ parti principi sunt vicinæ, quæ ob cōsortium simul afficiuntur, vt inflammatio auris, cerebro, pulmonū, cordi promptè communicatur: aliæ sunt exquisito sensu insignitæ, veluti diaphragma, vterus, vesica, & orificium ventriculi, quibus inflammatis & legitima victus ratione, opportunisque præsijs haud cunctanter succurrendum est. Prætereà aliæ sunt remotæ à partibus principibus, sed excrementis excipiendis dicatæ, sicuti intestina & renes. Pro quarum partium varia inflammatione, varia viuendi lex & remedia imparia adhibebuntur. Nam cum infirmitas accedit ad partis principis inflammationem, aut publicam functionem obtinentis, aut sensu acutiore donatæ res magis in difficili & in dubio esse colligendum est. Cum autem inflammatio ventriculum aut hepar obsidet, victus tenuior est exhibendus. Porro vigilia in inflammationibus internis, somnus in externis commendatur.

Minuentibus humorem in prima cor. II.
poris regione cumulatū, ne pars inflam-

matione affecta humores in corpore redū-
dantes calore & dolore proliciat. Cliste-
res ad hunc vsum accommodabuntur, qui
à parte affecta humores excremētitos re-
uellant. Tamen abstinendum est à validis
pharmacis in principio inflammationum,
ne humorem turgentem exagitent, in par-
tem conflictatam præcipitent, & calorem
augeant. Quinetiam sunt parum tuta phar-
maca in inflammationibus partium prin-
cipum, & præfertim in inflammationibus
pulmonum, pleuritidis, & partium vita-
lium, quæ corpus imbecillius reddunt, &
euacuationem, quæ per sputa fieri debet,
remorantur, & præpediunt. Nam in inflā-
mationibus partium, aut paulatim excer-
nitur materia, vt in pleuritide, quæ per lo-
ca conuenientia deriuanda venit, aut pau-
latim resoluitur, quæ peculiaribus subsi-
dijs iuuāda est, aut in suppurationem mu-
tatur, cui arte opitulandum est.

- III. Reuellentibus & vacuantibus, quæ ef-
fœratam irruentis sanguinis incursionem
compescunt, plenitudinem detrahunt, &
partem affectam aliqua putrescētis humo-
ris portione subleuant. Vacuatio enim san-
guinis & humoris in corpore præter natu-
ram contenti, reuulsio & depulsio procū-
bentis eiusdem in contrariū retractio pro-
prie

prie definitur, quæ recto venarum & fibrarum cursu è regione partis affectæ ex ampla, & vicina vena, & in principio administrari debent. Siquidem ex ampla vena vberius, ex vicina celerius & validius effunditur sanguis, nimirum ex vena humerali, seu cephalica ex partibus, quæ sunt supra clauiculas, interiori ex his, quæ inter clauiculas & renes, media ex vtraque parte vberius, validius & commodius reuellût. Si profectò inflammatio malè habet cerebrum, vt sphacelismus cerebri, phrenitis, inflammatio aurium, angina, fauces, humeraria, inflammatio pulmonum, pleuritis, media, sicuti ea, quæ diaphragma, ventriculum, renes, intestina, vterum, vesicam & scrotum exercet, resignanda est vena. Si tamen aliquid maligni in vtero lateat, quod ex lue venerea contractum sit, vena malleoli aptius pertundenda venit, ne contagiosa veneni labes in venas maiores, & in totum corporis habitum retrahatur. Semper igitur è directo partis affectæ ex vena ampliore & viciniore demetur sanguis. Post harum venarum sectionem sedato fluxionis impetu in affectibus capitis vena frontis, aut puppis, & cucurbitulæ cū scarificatione scapulis admotæ, in aurium inflammationibus, vena sub aures, in angina

quæ sub lingua apparent, non aliter quàm in affectibus renum, vteri, vesicę, & scroti venę malleoli, aut poplitis commodè aperientur. Etenim cùm æger plethora laborat, & effrœnatus est fluxionis impetus, venę superiores ad reuulsionem sunt secāde, ne humor ferociens, quū natura moderari res nequit, meatumq; ad exeundū nō nanciscitur, præcipiti motu in partem affectam irruat. Cùm verò iufluxit materia venę poplitis & malleoli, tutius referendæ erunt. Quantitas porrò sanguinis mittēdi ex magnitudine morbi, viribus ægrotantis, temperamento, habitu, & ætate eiusdem constitutione cœli, vacuatione præcedente, viuendi genere, rerum externarum futura occurratone, & symptomatum futurorum sæuitia perpendenda veniet. Non enim minore cautione prospicienda sunt futura, nempè cœli constitutio calida, vel frigida, victus ratio parior vel liberalior, symptomata, utpote vacuationes immodicæ, & excrucians dolor, quæ largiorem sanguinis missionem dissuadent, ne vires necessarias nimio opere prosterнат, noxioque aut intempestiuo victu penuriam reparare in egri perniciem nos postea cogat. Hoc nomine Hippocrates & Auicennas in pleuritide

ritide biliosa sanguinem non demebant, solisque fomentorum præsidij affectum expugnari posse sibi persuadebant, metuebantque austro perflante euacuationem in pleuriticis apud Athenienses parum tuam esse. Idcirco in principio febrium symptomatarum & essentialium sanguis est mittendus, ut aperte confirmarunt Greci contra mentem Arabum, antequam inualescat morbus. Hippocrates in plethorico corpore & viribus validis, usque ad animi deliquium sanguinem vacuat. Iterata verò vacuatio in viribus elanguescentibus magis à Galeno probatur. Quamobrem in omni inflammatione profliganda desiderantur, vacuatio & reuulsio, quarum una celebratur, cum partes incolumes sanguinem vacuatione, ligaturis, & frictionibus subtrahunt: altera de qua mox differendum est, sanguinem depellit, & transfert ad alia membra, ut in principio inflammationum astringentibus remedijs utimur, quæ humores à parte affecta protrudunt.

In hoc sanè affectu, authore Galeno, exiguus humor ante purgationem ad magna vasa commigrat, minimumq; malum committit, quod facile à natura euincitur, nisi locorum fuerit plethoricum.

Repellentibus humorem profluentem in partem affectam mediocribus subsidijs ne nimio opere repellentia scyrrum ingenerent, aut partis præcipue principis temperiem immutent, aut humorem crasfiorem reddant, & alius impingant, aut per accidens caloris feruorem augeant. Vacuatio igitur, vt placuit Galeno, aut sit per translationem, cum repellentiũ ope humores in alias partes stante fluxionis principio auertuntur, qui ob nimiam horum copiam in magna vasa traijciuntur, natureque beneficio sine aliquo detrimento edomantur: Altera est cum partes incolumes sanguine euocant ligaturis et reuulsione de qua mox disputatum est. Quamobrem in principio inflammationis admouenda erunt parti inflammationem malè habenti, cuius conditio præstantia, sensu exquisito, vel hebeti, situ & cõformatione æstimata ad vnguẽ perpendetur. Nemo equidem nescit omni parti inflammatae eadem remedia localia non æquè congruere. Siquidem partes principes & exquisito sensu insignitæ mitiora postulant remedia, quibus vt verè censerent Arabes, admiscenda sunt roborantia & parti familiaria, veluti hepati, cichoriũ & eupatorium, corallus, & spodium, lieni asplenium, & scolopendrium, cerebro

rolæ

rose, thoraci tusilago, & scabiosa apte præ-
scribentur. Itaque repellentia in phreniti-
de & spaciismo accommodata sunt, suc-
cus rosarum, & acetum, conserua rosarum
& earum succus, oleum rosatum & acerū
cum caphura permistum, quæ syncipiti &
fronti admouebuntur. In inflammatione
hepatis succus solani adhibitus nō parum
confert. Tamen Arabes & Græci inter se
dissentire videntur quod illi refrigerantia,
vt succū solatri in principio inflammatio-
nis adhibent. Græci verò relaxantibus, &
roborantibus ad refrigerium robur, & ad
discutiendos vapores, nempe rosis & ab-
synthio in oleo & aqua decoctis vtuntur.
Sed hi non discrepant cū ordine immu-
tato in eundem scopum contendant. Præ-
terea modice frigida ad vitandā obstructio-
nem sunt præscribenda, cuiusmodi sunt
syropi cydoniorum, & rosatus perfusi cum
his, quæ modice aperiunt & detergant,
vt decocto agrimonix, oxalidis hepaticæ
plantaginis & cichorij. Non parū prospe-
ro & foelici euentu imponentur epithema-
ta ex aquis rosarū, solani & plantaginis
confecta, & sacculi ex rosis, balauistiis,
spodio & santalis concinnati. Olea por-
ro videntur esse in omniū partiū inflam-
mationibus, præcipue hepatis parū tuta,

F

ne promptè incalescant. Præterea singu-
lari cautione obseruandū est, ne in angina,
pleuritide, & inflammatione mediastini
repellentia inducantur, ne humorē pec-
cantē ad partem inflammatione affectam
intro concitent, sed tutius & commodius
lenientia & resoluentia præscribentur. In
principio verò anginae, cū in fauces ir-
rumpit sanguis gargarismi refrigerantes,
& astringentes decernendi erunt. In aliis
verò inflammationum generibus subsidio
repellentiuū tutior fit retrocessus, qui etiā
vel attracta vel transmissa materia in omni
inflammatione dextrè administratur.

- v. Materiam apparantibus, quæ pro singu-
lis partibus vitiatis, humorum naturā, eo-
rumque sedibus variè adhibetur, vt exem-
pli gratia: Si inflammatio ad hepar obre-
pit, præparantibus, coquentibus & astring-
entibus ad partis affectæ, natura laxæ ro-
bur, & aperientibus simul mistis præpara-
tio procuranda erit, nempe syrupis è cicho-
rio, è ribes, ex oxalide, acetoso simplici, &
rosato, cū humor biliosus mali causam
dedit. Si verò humor pituitosus sit huius
morbi seminarium, oximel simplex, mel
rosaceum, & syrupus capilli Veneris legi-
timè & cōmodè instituentur. In angina pi-
tuitosa humor oximelite simplici, & mel-
le ro-

le rosaceo cum aquis betonicæ, & absyn-
thij apparandus venit, & biliosus detergē-
dus, alterandus, & protinus educendus
censetur. In pleuritide biliosa, syrupi vio-
lacei, & è iuiubis, in pituitosa syrupi capil-
lorum Veneris, è glycyrrhiza, & è scabiosa
eximiè conferre creduntur. Idē statuendū
erit de aliorum humorum præparatione.

Purgantibus humorem exuperantem, v r.
præcipuè cum febris essentialis simul cum
symptomata implicata est, aut cum hu-
mor vitiosus primam corporis regionem
occupat, ad quam pertingere non potuit
venæ sectio, aut cum febris incendio reli-
quæ humorum supersunt, quæ nouam fe-
brem minantur. Etenim in febre sympto-
matica summa cautione prouidendum est,
an copuletur febris essentialis, vt huius se-
minarium victus ratione & pharmacia ex-
tirpetur. Quinetiā si humor peccans deli-
tescit in prima corporis regione, aut malè
aliquā partem affectat, & habet, quam de-
mere nō potuit, sanguinis missio leui phar-
maco, præsertim morbo inclinante, & quā
longè fieri potest à parte affecta vtiliter &
cōmodè eximendus est, q, minimè videtur
improbare Gal. 13. Method. & Hipp. in curā-
da pleuritide, quæ ad hypochondriū vsq;
extenditur. Præterea omnes Medici Græci

& Arabes gibbam hepatis diureticis, cauā clisteribus, & blandis medicamentis repurgandam esse contendunt, vt cassia, manna, & rheobarbaro. Cæterum eò spectabit opera, vt à parte affecta purgationis ope reuellatur humor, veluti exempli gratia: si renes inflammatione conflitentur, clisteribus, & leui pharmaco, si intestina, diureticis deriuabuntur.

- vii. Digerentibus materiam relictam, siue in pleuritide, siue in angina, siue in phrenitide, & in alia quauis parte inflammata: quæ peculiaria requirit remedia. Etenim in angina nidus hirūdinis frixus cum pinguedine & parti laboranti impositus, in pleuritide, muccago seminis lini, scenigræci, oleum camamelī, & amigdalorum dulcium foris adhibita, sicuti intus sumpta dens apri, priapus cerui, corallus, flos, aut radix lappæ, & testæ auellandarum rubrarum cum hydromelite ex scabiosa, tussilagine, passulis, iuiubis, sebestem, floribus violarum, & stœchados, paratō conferre creduntur. Quocirca pro varia singulorum temporum mutatione varia sunt instituenda remedia, vt in principio fluxionis astringentia, & repellentia, in incremento resoluentia, & digerentia, & parum astringentia: in vigore anodina, & digerentia: in declina-

clinatione pura digerentia sunt instituenda: quæ via optatior est quàm ea, quæ suppurantibus tentatur. Galenus non videtur contra suorum aduersariorum opinionem roborantia & astringentia cum digerentibus ob maius commodum, quàm incommodum futurum, in discutiendis parvis principis tumoribus perperâ adhibere.

Suppurantibus inflammationem, quæ IIX.
nullo euinci artificio potuit, utpote in angina emplastro seminum lini, fœnigræci: in inflammatione hepatis cataplasmate ex decocto maluæ, & absynthij comparato. Abscessus rumperetur sternutamento, aut in angina cultro ligneo, aut spongia cum filo alligata. Vlcus porrò detergetur melle rosaceo & decocto hordei, & tandem glutinabitur terra Lemnia, bolo armenio, & sanguine draconis. Interim detergetur humor per proprios & breuiiores meatus, per quos natura solita est sua excrementa deponere. In suppurando emplastica admoventur, ut calor innatus influentis comes facilius materiam euincat. In febribus verò putridis pori semper referantur, ut humor putris & fuliginosa excrementa foras euocentur.

Intemperiem emédantibus sumptis & IX.
admotis, ut in inflammatione vetriculi &

hepatis, tabellis trium santalorum, & di-
margariti frigidi, conseruis & conditis ro-
sarum, & buglossi, & admotis epithemati-
bus, & sacculis accommodatis, & in phre-
nitide, lotionibus pedum & manuum, &
frontalibus peculiaribus capiti admotis,
& sumptis, nempe syrupo è nymphaea, &
dyacodio ad somnum accersendum, & in-
temperiem obliterandam. Si febris sym-
ptomática ab exuperanti putridorum hu-
morum prouentu circa partem aliquam,
præsertim principē inhærentē proficisca-
tur, victus tenuis & tenuēs primo loco in-
stituetur: deinde humor excrementitijs
repurgandus est, vt expeditior & tutior ri-
uulis exhaustis ad fontem mali progressus
fiat. Si corpus plethora laborat, vena è re-
gione viciniore partis affectę resignabitur,
vt optatius curationis votum cōsequatur.

Si verò corpus non sit plethoricum, ha-
benda erit potius ratio humoris corrupti
circa partem cōgesti, qui mali initium de-
dit. Non enim ex veris artis legibus medi-
cinam facit, qui relicto impuro humore fe-
bris symptomaticæ fomite, syncertum san-
guinem incōmodè & inutiliter detrahit.
Itaque humorum sentina circa partem af-
fectam cumulata, ordine & sensim appa-
rabitur, & expurgabitur. Cū enim, ex-

em pli

empli gratia, humores circa hepar infarci-
untur, syrupis è cichorio, capillorum Ve-
neris, oxymelite simplici cum decocto ra-
dicum graminis, filicis, asparagi, foliorum
agrimoniæ, scolopendrij, cassuthæ & lupu-
li, & sacculis accommodatis parti affectæ
admotis præparabuntur. Postquam appa-
rati fuerint medicamēto peculiari, pro hu-
moris putrescentis situ purgante euacua-
buntur, veluti rheobarbaro & agarico tro-
chiscato. Postremò hepar cōditis, tabellis,
& epithematibus ad hoc negotium facien-
tibus roborabitur. Si verò febris sympto-
matica primordia accepit ab vlcere, hoc
primum detergendum est, vt exempli gra-
tia, vlcus pulmonum lacte asinino, deco-
ctis & syrupis peculiaribus eluetur, suffi-
tibusque, & alijs proprijs remedijs tan-
dē glutinabitur. Si verò à partis principis
corruptela febris symptomatrica causas tra-
hit, hæc mortifera affectus sæuitia nullis
machinis expugnari potest, sed rem in an-
gusto esse certò portendit, quæ amicis &
necessarijs indicanda est. Deplorati enim
& deperditæ sanitatis ægri non sunt attin-
gendi, ne ars temerè infametur. Quod aut
pars absoluta putredinis labe vitiata nul-
lo subsidio redimi potest, apertè confirma-
runt Hipp. & Gal. his Aph. quibus cerebrū



syderatum est, intra dies tres intereunt: si verò hos superauerint, sani fiunt. Et aliò Aphorismo, quibus purulentū iecur adurit, si purum pus effluat, & album, salui fiunt, in tunica ipsius pus continetur: si verò qualis amurca profluat, intereunt. Nam teste Galeno, quibus est in tunica pus illiusa iecoris substantia omnes seruantur. Quibus verò in carnem vsq; iecoris corruptio penetrat, hi bona ratione moriuntur. Febris cōtinuis ita discussis, nunc febres intermittentes excutiendę erunt, exordio sumpto à curatione quotidianę.

De Curatione febris Quotidianę intermittētis.

CAPVT IX.

QVamuis omnes febres intermittentes sint curatu faciles, si pro vernacula vniuscuiusque humoris morbum committentis peculiari eiusdem sede & parte affecta certa remedia dextrè & oportunè adhibeantur. Tamen ob differentiam singulorum humorum segnius discussam, focum eorundem ignauius perspectum, partem affectam præcipuam horum effectricę imprudentius neglectam, & periculosum frugiferę methodi contemptum, sunt vt plurimum diuturnę, aut mortiferę. Quo-
circa

circa vt res exemplis dilucidius illustretur, exordiar à varijs febris quotidianæ seminarijs, quæ pro natura & differentijs pituitæ, diuersas eiusdem febris species promunt. Cum enim humor pituitosus salsus quotidianam ingenerat, perniciosior putredinis labes, magis molesta sitis, horror vehementior, urinæ ruffæ & velocior pulsus, quàm in cæteris pituitæ differentijs perspicuè apparent. Cum acida pituita febrem quotidianam peperit, nulla sitis, sed fames & frigus, sicuti cum dulcis est eiusdem fermentum, magis sopor comitatur. Huius porro febris scaturigo circa ventriculum & venas meseraicas penitus residet, vt in libr. de febribus latius disputatū est. Quod ad partem affectam spectat accusandus videtur esse ventriculus, vt Græci & Arabes vno & eodem cōsensu probauerunt, certa quæ experientiæ fides commonstrauit. Quæ cum ita sint pro varijs pituitæ non naturalis febrem quotidianam inuentis speciebus, eiusdem foco & parte affecta legitima victus ratio & tempestiua remedia instituentur. Igitur huius febris curatio septem remediorum capitibus continebitur.

Victus ratione quæ pro varia pituitosi i. humoris natura variè instituitur, vt in pi

ruita salsa magis refrigerans & humectās,
& minus incidens, quā in alia pituitæ spe-
cie, magis attenuans & incidens in acida,
magis temperatus in dulci ritè decernetur
Cui victus decreto minime reclamatione Gale-
nus: quippe varias pituitæ non naturalis
differentias minime ignorauit, pro cuius
indicationibus magis vel minus attenuan-
tia, siue alimenta, siue medicamenta neu-
tquam improbauit. Idcirco in principio
morbi magis coquentibus, & in augmen-
to post tenuē humorem expurgatum, in-
cidentibus & attenuantibus, pro varia hu-
moris natura magis vel minus opitulandū
erit. Post intemperantiam & ingluuiem
in principio febris quotidianæ tenuior
victus erit præscribendus, vt natura noui
alimenti appulsu minime præpedita libe-
rius concoctioni indulgeat. Vfus porro
modus, & occasio cibi exhibendi in indu-
cijs & intermissionibus febris ad legitimū
concoctionis tempus studiosè observa-
buntur. Quocirca his stabilitis, æger pri-
mum fruatur aëre puro ad calidum & sic-
cum inclinante, vel industria sic parato.
Cibi erunt euchimi, incidentes, & exte-
nuantes magis vel minus pro humoris na-
tura, non admodum calidi, si Auicennæ fi-
des adhibenda est. Id genus erunt panatel-
la, iu-

la, iuscula, capi, pulli, carniū hēdinarum, petroselino, hyssopo & thymo alterata, pressa, & consumpta, & contusa carniū delicatarum. Potus erit vel hydromel cinamomo probè aromatizatum, vel aqua cinamomi & sacchari, vel ptisana cum hordeo, coriandro & cinamomo comparata, vel vinum oligophorum. Interim in principijs accessionum à somno sunt expurgiscendi ægri, in vigore potu sudores mouendi & in declinatione eliciendi. Porro victus ratio instituetur semper iure ex virium perspicientia, & loco, vt ex accessionum inducijs.

Minuentibus excrementitium tenuem & ad excretionem facilem humorem, aut diaphœnici, aut hieræ picræ, aut electarij indi maioris drachmis tribus, vel semuncia, quæ bolo cum pane azimo, vel dissoluta cum hydro melite bene cum cinamomo vel agallocho aromatizato, vel decocto pectorali exhibebuntur. In eundem scopum præscribi poterunt catapotia, quæ ex pillularum, hieræ simplicis scrupulis duobus, agarici trochiscati scrupulo vno, cū oximelite, vel decocto sarsæ parillæ unita ornamabuntur. Clysteres etiā ex decocto carminatiuo & remollientiū cōparati probabuntur, cui addentur diaphœnicum, hiera

picra, mel rosaceum, & oleum liliorum, & camameli. Quocirca minuendus erit primo loco humor, qui in vetriculo & venis meseraicis residet, vt oneris portione leuetur natura, tutiorque præparatio postea procuretur. Ab agarico abstinendū est nunc qui in principio humores exagitat.

- ¶ 11. Apparātibus humorem crudum & dulcem concoquendo, crassum attenuando, lentum detergendo, & durum molliendo. Id genus censentur syrupi è mentha, è corticibus citri, & ex absynthio, qui concoctionem iuuant, & calorem nostrū augent, necnon incidentes & detergentes, nempè oximel simplex, mel rosaceū, syrupi è duabus & quinque radicibus cum decocto eupatorii, chamædis, hyssopi, & fœniculi perfusi. Interim habenda erit ratio humoris peccātis febrem infligentis, vt si pituita acida, & vitrea exuperat, magis coquētib, attenuantibus, & detergentibus, pituita dulcis minoribus, & clementioribus horū præsidij, salsa minus calidis, coquētib, & incidentibus præparabitur. Cū enim varij existunt incidentium & attenuantium ordines, varia pro humoris peccantis calore & crassitie accommodabuntur remedia. Qualitas igitur præparantiū pro humoris natura & crassitie, quantitas pro

pro copia & crassitie, vsus & occasio exhibendorum in accessionum inducijs vtiliter & commodè administrabuntur. Galenus & Auicennas vno & eodem ore confirmant in principio febris à multum calidis & incidentibus abstinendū esse: quandoquidem ratum est axioma à leuioribus semper auspicandum esse. Præterea in hoc plurimus debet esse medicus, vt cogitet de remedijs extrinsecus admouendis, quæ ad affectum eximendum non parum faciunt. Sacculi autem regioni ventriculi, & venarum meseraicarum admouendi comparabuntur ex absynthio, saluia, mentha, thymo, betonica, synfibrio, radicibus cyperi, calami aromatici, corticibus citri, maceris, seminibus anisi, cumini, fœnigræci, floribus camamelī, meliloti, geniste, & anethi, quæ decoquentur in aqua addendo mediam partem vini generosi. Fit verò coctio contra aduersariorum Galeni mentem humoris crudi & dulcis, qui si fuerit in ventriculo, aut venis mesaraicis, aut magnis vasis facile edomatur, & in sanguinē frugi, aut saltem pituitosum conuertitur.

Purgantibus humorem sensim & pedetentim apparatus signis coctionis apparentibus, vt scrupulis quatuor agarici trochiscari cum aqua vitæ drachma vna, cina-

IIII.

momī optimi scrupulo vno in vino infu-
sis, cuius expressiōni addentur diaphœni-
ci drachmæ duæ, syrūpi capillorum Ve-
neris drachmæ sex, fiet potio. Ad eundem
scopum turbit. optimi drachma vna, ci-
namomi optimi scrupulus vnus permis-
centur cum vino, & ægro non parum fœli-
ci successu exhibentur. Arabes autem mi-
rificè commendant agaricum & turpe-
rum. Præterea folliculi sennæ siue infusi,
siue decocti cum aniso, & cariophilis, &
therebintina cum puluere hieræ Galeni
permista supra modum conferunt. Quo-
circa cū febres omnes intermittentes
in prima corporis regione focū obtineant,
harum sentina protinus exhausta est,
triplici remediorum genere, nempe phar-
maco, vomitum elicientibus, & clysteri-
bus. Etenim hæc præcipua remedia vniuer-
sam putredinis illuuiem febrium intermit-
tentium sobolem funditus & radicitus
extirpant, modò humores rite sint appa-
rati. Interim cautio adhibenda erit, vt mo-
tus humorum studiosè obseruetur, qui si
sursum irrepat post legitimū præpara-
tionis negotium oximelite comparatum,
vomitū proliciētib. iuuabitur. Pharmacū
verò & clysteres præcipuam putredinis
seaturiginem febris effectricè per aluum
edus

educunt. Igitur eò vsq; apparantia & purgãtia medicamẽta instituẽda veniũt, quoad tota mali radix penitus euellatur. Sunt enim curatu difficiles omnes affectus, cũ hæc methodus siue in victus ratioẽ, siue in pharmacia ad amussim non obseruatur.

Vacuantib. potius ex opinione Arabum v.º quàm Græc. Arabes enim contendũt cũ vrinæ rubrę se p̃dunt, & cũ metus est continue, venã pertundendã esse. Mesues precipit die pari sanguinẽ potius demendum esse. At Auicen. opinatur dextrã estate, sinistrã hyeme elidendã esse, sanguinemq; parca manu euacuandũ. Etenim verũ & certũ est Arabũ decretũ in febribus intermittentibus, cũ metuunt cruditatẽ futurã in febribus pituitosis, & in biliosis efferuescentiam. Nam vberior sanguinis missio in febre quotidiana intermittẽte cruditatẽ cõtumaciore: in febre biliosa efferuescentiã futuræ continuæ autorẽ vt plurimũ inuoluntate solet. Hoc nomine Galenus à sanguinis missione in epiala abstinendum esse censet. Cacochemiã enim, quæ primam corporis regionem obsidet, purgatio potius, q̃ vacuatio magis congruere videtur. Siquidem hæc ad primã corporis regionẽ vix pertingit, in locumque sanguinis puri vacuati humoris peccantis colluies

nō sine magna ægri offensione traducitur. Galenus tamen in libris methodi tradit hanc præsentissimum omniū febrium putridarum esse remedium, quod continuis febribus potius, quàm intermittentibus conuenit. Nam ea, quæ à Galeno in febribus intermittentibus instituitur, non ratione febrium ipsarum, sed plethoræ, & metu futurarum, continuarum, sæuiorumq; symptomatum decernitur. Si sanguis mutatur arcendus erit æger statim à somno, non ob subitum, vt placuit Auicennæ, sanguinis ad interna refluxum, vasorumque contractionem, sed potius ob præcipitem agitationem, permutationem sanguinis, quæ ægro non mediocre negotium facere potis est.

VI. Vrinæ & sudores cientibus pro humoris copia, vel crassitie clementioribus, vel validioribus, quæ quidem ante signa concoctionis parū tuta esse solent. Mouebuntur autem sudores & urinæ iusculis petroselinii, asparagi, hyssopi, thymi & cinamomi, syrupis capillorum Veneris, & hydromelite, in quo decoquentur radices petroselinii, polipodij quercini, acori & apij p-
bè cum cinamomo aromatizando. Mel autem est huic feбри peculiare subsidium ab Arabibus usurpatum. Ad hæc vinum & acetum

æetum scylliticū ad humores crassos præparandos, extenuandos, per aluum & vrinas euocandos, eximie celebrantur.

Roborantibus validioribus, vel clementioribus pro maiori vel minori intēperie accōmodandis. Sunt aut in hac febre ventriculus, & hepar duæ partes affectæ, quæ sumptis & admotis præsidijs pristinae sanitati restituentur. Sumpta censentur peculiaria remedia, electarium aromaticum rosatum cum puluere galangæ permistum, cortex citri condita, conserua betonica, dianisum, diacuminum, vinū absinthites, theriaca, & mithridatiū. Linimentum ad mouendū regioni ventriculi cōparabitur ex oleo nardino, absynthino cum puluere nucis moschatae, cardamomi, galangæ & macis compositum.

Symptomata emendantibus, inter quæ primum sese offert frigus febribus quotidianis peculiare, quod demulcetur in principio accessionis illitu olei irini, camamelii, & vini cretici addendo assam aromaticā & mirrham. Cum verò somni immoderati importunitas obrepit, excitandus erit æger odorematis nigellæ romanæ, caryophyllorum & nucis moscatae. Imbecillitas & dolor ventriculi oblitterabuntur accommodata victus ratione: dolorem lenienti-

bus, materiam peccantem purgantibus, & intemperiem delentibus. Appetentia immoderata si contrahatur in conualescentibus à penuria & partium attrahentium robore, cibus euchimus concoctu facilis parca manu et frequenter exhibebitur. Si intemperies frigida, aut humor pituitosus acidus huius mali causam dederit, abigetur calida victus ratione, subsidijs pituitosum humorem præparantibus, & vacuantibus, & reliquias resoluētibus, vt vino generoso, aut hydromelite multum aromatizato, in quo ebulierint pulegium, thymus, & hyssopus. Quæ appetentiam prosterunt ob ventriculi infirmitatem alijs affectibus succedentem, sunt prorsus repudianda. Singultus materiam mali fomitem purgantibus, reliquias digerentibus, & intemperiem corrigentibus vtiliter et comode profligitur. Epiala porro est ex harum febrium colonia quam prælidia supra commemorata, sed magis incidentia, et attenuantia strenue demoliuntur.

De Curatione febris tertianæ intermittētis.

CAPVT X.

Febbris tertiana septem remediorum generibus adimitur.

VICTUS

Viſtus ratione, quæ in exquisita terti-
 na tenuior magis refrigerans, & hume-
 ctans, in notha plenior non ita refrigerans
 & humectans, ſed aliqua ex parte abſter-
 gens & attenuans ſit. Vnde Galenus cōtra
 opinionem Alexandri Trailliani ad legiti-
 mam tertianę nothæ curationē aliquid pi-
 peris & organi vtiliter & cōmodè permif-
 cet cum ptiſana. Piper enim & origanum,
 ſi parca manu cum alimentis commiſcean-
 tur, in temperamentiſ minimè calidis &
 ſiccis incommodum adferre nequeunt.
 Arabes contendunt in tertiana notha à bi-
 le vitellina contracta, alimenta calida, &
 quæ facilè putreſcunt parū tuta eſſe. Quod
 autem Galenus in tertiana vitellos ouorū
 inſtituit, qui facilè vitium faciunt & cor-
 rumpuntur. Porrigit equidē febricitantibus,
 qui alimento euchimo & concoctu facili
 indigent, & quibus humorum impuritas
 in ventriculo neutiſquam luxuriat. Quocir-
 cā in exquisita tertiana viſtus refrigerans
 & humectans decernendus eſt, vt ſunt hor-
 deata, iuſcula borraginis, oxalidis, lactucæ
 & endiuia, ſimul perfuſo ſucco limonum
 & arantij, quæ ex pullis & carnibus vituli-
 nis comparabuntur. In tertiana notha vi-
 ctus paulò plenior & magis attenuans præ-
 ſcribendus eſt, nonnihilque cum herbis ſit

pra commemoratis petroselini & asparagi simul commiscebitur. Græci & Arabes in exquisitæ tertianæ principio tenuem victum, in augmento tenuiorem, in statu tenuissimum: in declinatione pleniorē exhibent. Tamen Galenus in tertiana notha alternis diebus cibum instituit, vt natura alimento minimē præpedita in humoris cōcoctionem fœlicius incūbat. Quamobrem legitima victus qualitas pro natura & conditione humoris peccantis, limitatior quantitas pro affectus diuturnitate, & virium firmitudine, & infirmitate: vtendi modus & occasio pro accessionum inducijs studiose obseruabuntur. Medici autem consiliū eò dirigi debet vt quatuor aut quinque horis ante accessionem alimentum præbeat, quo natura satis vacui tēporis concoctionis gratia ante accessio- nis insidias nanciscatur. Præterea in principio accessionum à somno ægri excitandi, in incremento meatus frictionibus aperiendi: in vigore potionibus ptisanæ & syruporum accommodatorum, sudores mo- uendi, & in declinatione eliciendi veniūt. In tertiana autem exquisita ptisana: in notha aqua cinamomi & sacchari, aut hydromeli aquosum magna cautione exhibebuntur. Vsurpanda etiam veniunt elixa potius

tius quàm assa. Quinetiam astringentia, vt
pyra cane peius & angue sunt vitanda.

Minuentibus humorem biliosum natu-
ra tenuem & ad excretionem minimè cō-
tumacem medicamentis clementioribus,
nempe cassia, manna, myrobalanis, thama-
rindis, rheobarbato, & alijs eiusmodi, quę
in tertiana exquisita mirè congruunt. Ad
hunc & eundem scopum iniiciuntur cly-
steres accommodati, qui sæpè repetiti ad
humoris peccantis euacuationem non pa-
rùm commendantur.

Vacuantibus, non ratione febris, sed ple-
thoræ potius in tertiana exquisita, quàm
vacuationem dedita opera prætermisisse
ad Glauconem videtur Galenus: quia post
tertiam accessionem alibi venam pertun-
dit, quod tempus ob vigorem morbi (in quo
authore Hippocrate, nihil tentandum est)
suspectum est. Arabes verò in hac sanguinis
missionem decernunt, vbi plethora, & vri-
næ rubræ apparent. At in tertiana notha
Græci & Arabes venam pertundunt: hiq;
venam dextram æstate, sinistram hyeme e-
lidunt. Alij verò partis affectæ, quàm cœli
maiorē rationem habent. Interim vacu-
atio administrabitur, cum exuperans cru-
ditas in primis venis minimè reconditur.
Quod hoc seculo medici Thessalonicæ in

Græcia perperam obseruare videntur. Amatus enim Lusitanus scribit Theſſaloni-
cæ febres tertianas ob aëris iniuriam & in-
clementiam mortiferas eſſe. Verùm in hi-
ſtoria & curatione huius febris tradit ob
crāſſam & ſordidam victus rationem cor-
pora multis & crāſſis humoribus ſcatere,
qui eiſdem testimonio ob frequentē &
vberiorē ſanguinis miſſionē in magna
vaſa traijciuntur, febreq; funeſtas ingene-
rant, & in diſcrimen vitæ conijciunt.

ps
l. 4. r.

Humorem apparantibus bilioſum in
exquiſita tertiana, aut iuſculis oxalidis,
endiuiæ, borraginis, & bugloſſi, aut ſyru-
pis è cichorio ſimplici, ex endiuiā, & a-
cetoso ſimplici cum aquis ſtillatitijs ci-
chorij, oxalidis, & endiuiæ ſimul perſuſis.
Hi equidē ſyrupi induſtria Arabū excogi-
tati ſunt, magis accōmodati & peculiareſ,
quā oximel Græcorum. Nam in ſincera
bile omnia præſidia, quæ mel recipiunt,
ſunt parū tuta. In tertiana verò notha ſyru-
pi capillorū Veneris, & oximel ſimplex cū
aquis agrimonie, aſparagi, & caſſuthæ per-
miſta rite præſcribuntur. Nō ſolū in ſumē-
dis: ſed etiā in admouēdis præparandi erūt
humores ſacculis, regioni hepatis & vena-
rū meſaraicarū admouendis qui ſupra ſunt
explicati. Arabes aut cataplaſmata & vn-
ctiōes

Ationes in tertiana notha ad eundem scopum commendarunt.

Purgantib. humorē biliosum in exquisi- v2
ta tertiana, cum ad sui excretionē inuitat *purgat*
materia apparentib. signis concoctionis,
nempe rheobarbaro, cassia, thamarindis,
manna, & myrobalanis, & syrupo ex infu-
sione rosarū. In tertiana notha nonnihil a-
garici, & senne, aut diaphœnici simul per-
misceri poterit. Cū aut ob humorū perfu-
sionē nulla ferē sit exquisita, ad sensum ve-
rō si res referatur, aliquis censeatur humor
simul cū pituita exuperante, aliquod pecu-
liare pharmacū permiscebitur. Præterea si
sursum irrepat humor biliosus, præsertim
in gracilib. & ad vomendū facilibus per su-
perna, id est, vomitum ciente fœliciter &
commode expurgabitur. Arabes in princi-
pio & declinatione accessions ob humo-
rum agitationē vomitū decernebant. Inte-
rim in purgando habenda erit ratio humo-
ris biliosi, q ob incendiū in atrā bilē vt plu-
rimū degenerat, febremq; quartanā parit.
Quæ cū ita sint, præcipuū curationis nego-
tiū eò spectabit, vt p humoris peccātis na-
tura, medicamēti qualitas, peiusdē natura
& quantitate, téperamenti occasione, &
cœli constitutione, quantitas, haud aliter,
quàm pro humoris motu vtendi modus,

& pro varijs accessionum inducijs, opportuna occasio studiosè ac prudenter instituantur.

VI.

*Singula
reliqua.*

Sudores & urinas mouentibus in declinatione morbi & accessionum, præsertim post signa concoctionis, vt syrupo acetoso simplici, & capillorum Veneris cum decocto asparagi, graminis, aut mulsi, quatuor seminum frigidorum maiorum. Greci & Arabes non solum pharmaco, vomitum elicientibus, & clysteribus, sed etiam urinas & sudores mouentibus, vtpote diureticis & balneo demolliuntur febrem tertianam.

VII.

*Altera
228
206.*

Alterantibus & roborantibus, ne ob vestigia empyreumatis relicta, & ob virium infirmitatem recidiva febris priore deterior emergat. Alterant autem & roborant diamargaritum frigidum, electarium triu fantalorum, conseruæ rosarum & buglossi, & ea quæ admoventur, veluti epithemata, & sacculi hepatis calidiori imponenda.

VIII.

*Symptomata
emendanda.*

Symptomata emendantibus vt sitim, linguæ asperitatem, dolorem capitis, vigiliæ importunitatem, deiectam appetentiam, & alia id genus, quorum curatio iam tradita est. Sitim verò statim arcet, decoctum hordei, iuiubarum, sebestem, glycyrrhizæ, feminis cucurbitæ & lactucæ. Scabritiem
verò

verò linguæ delent alumen & saccharum
rosatum, cum aqua rosarum mistum.

De Curatione febris Quartanæ.

CAPVT XI.

FEbris quartana nouem præsidiorū generibus expugnatur, quæ ægrè oppugnatur lethifero, vt ait Poëta, Autumno cedente pruinis, & cum deformis hyems stridere cœpit.

Victus ratione, quæ pro maiori vel minori humoris melancholici, aut atræ bilis intemperie & crassitie peculiariter instituitur. Etenim cum febris quartana ab humore melancholico frigido & sicco contrahitur, victus rationē minus calfacientē & magis humectantem postulat. Nam legitima & cōmoda victus ratio ab humore crasso & sicco tanquam præcipua indicatione sumēda venit. Igitur victus ratio magis humectans, & ob crassitiē non parum extenuans, & ob frigiditatem minus exuperantem mediocriter calfaciens instituenda est, vt humor præternaturā contraria victus ratione minori negotio edometur. Qua occasione ductus Aristoteles tradit problemate 58. victum calfacientem in febre quartana ob caloris augmentum exhi-

bendum esse. Cùm verò causas trahit à bile
retorrida & præassata, alimentis refrige-
rantibus & humectantibus ad ardorem
compescendum alendi sunt ægri. Vnde A-
uicennas refrigerantem & humectantem
victus rationē in hac febre quartana præ-
scribit, quæ indicationibus temperamen-
ti, humoris impensè calidi & sicci, & cæli
æstuantis respondet. Nec huius sententiæ
videtur reclamare Galenus, cùm in febre
quartana ab humore frigido & sicco geni-
ta, synapi & salsamenta decernit: quando-
quidem hæc parca manu, & per interualla
ad humores crassos extenuandos, & ad
robur, non ad peculiarem victus ratio-
nem instituit. Non autem Galenus contra
opinionem Alexandri Tralliani fuit vsque
adeò sui immemor, vt deficcantia humori
melancholico natura sicco, siue alimenta,
siue medicamenta porrigeret. Vbi verò fe-
bris quartana primordia accepit à sangui-
ne adusto, minùs retorrido, alimenta leni-
ter calfacientia & humectantia meritò sunt
offerenda. Itaque pro varijs humoris me-
lancholici & atræ bilis differentijs, quæ
febrem quartanam pepererunt, diuersa vi-
ctus ratio instituetur, habita etiam ratione
humoris magis vel minùs crassi. Siquidem
in principio febris ab extenuantibus &
inci-

incidentibus alimentis arcendi sunt ægri, ne ob humorem multum & crassum maior obstructio cōsequatur, duplexque aut triplex quartana ob eiusdem portionem in aliam partem traiectam ingeneretur.

Quocirca æqua animi lance alimenta erunt perpendenda, quæ si nimium frigida, crassa & flatuosa extiterint, humorem melancholicum increassant, & altius impingunt, haud aliter quàm nimis calida extorrent. Etenim cibi erunt concoctu faciles, mediocriter calidi & humidī, cuiusmodi sunt carnes hœdinæ, vitulinæ, volatiliū elixæ potius quàm assæ, & pisces saxatiles à Galeno non improbari. Arabes vinum album ad vrinas mouendas, & rubrum ad robur. Galenus album tenue, & olygophorum ad humores crassos incidendos, & vrinas ciendas præbent, quod diebus intermissionis tutius quàm alijs propinari poterit. Nā die accessionis aqua cinamomi & sacchari, aut mulsa commodius præscribenda veniet. Interim in principio & incremento febris ob diuturnitatē morbi plenus potius quàm tenuis: in vigore tenuis potius quàm plenus victus exhibendus est, ne natura à concoquendorum & excernendorum humorum negotio tunc perpes

ram auocetur. Quod ad occasionem alimen-
ti porrigendi attinet: in febre quartana ab
humore melancholico & sanguine adusto
procreata, quinque aut sex horis ante ac-
cessionem alimenta erunt conferenda, vt
natura peracta concoctione aduersus fe-
bris insultum sit vegetior. Verumtamen A-
rabes censent die paroxysmi ob imbecilli-
tatem ventriculi à cibo abstinendum esse.
Si verò à bile retorrida seminarium trahat,
ob humoris acrimoniam alimentum non
denegabitur, sed maturius exhibebitur.
Semper verò instituetur victus ratio, aut iu-
re ex perspicientia virium, aut loco & in-
ducij accessionum.

11. Minuentibus humorem fœculentum &
excrementitium clementioribus, & leuis
armaturæ præsidij, vt cassia, folijs sennæ,
epithymo, catholico & pilulis è fumaria,
catapotijs ex hiera. Cassia enim aut catho-
licum quinque aut sex drachmarum pon-
dere in bolo, aut foliorum sennæ drachmę
duæ infusæ & decoctæ, cum cinamomo &
caryophilis in iusculo pulli commodè su-
mentur. Quod verò Galenus prodidit cir-
ca principium ante concoctionis signa me-
dicamentis parcendum esse, ne contuma-
cior consequatur obstructio, & ex simplici
quartana duplex vel triplex emergat: Cū
equi-

equidem tria statuuntur concoctionis signa, nempe obscura, manifesta, & perfecta, in principio obscuris concoctionis signis se prodentibus natura medicamenta, quibus olim carebant Græci, non importunè propinanda erunt. Quocirca Gelenus validis medicamentis ante signa cōcoctionis manifesta non vtendum esse vere ac sapiēter præcipit. Celsus tamen censet post septimum diem repurgandum esse corpus medicamētis, quæ si mitiora sint, commodum potius, quàm detrimentum aliquod asferre possunt, præsertim vbi lienis affecti, aut paralytis suspicio imminet. Ad eundē scopum vsurpari poterunt clysteres accommodati, quorum ope humores molliendi, præparandi, & sensim euacuandī erunt.

Vacuantibus pridie accessionis ex basilica brachij sinistri, præsertim vbi aliqua solita hæmorrhoidum, aut mensium profusio suppressa, aut sanguis melancholicus luxuriat. Si equidem sanguis niger & crassus, audacius excernendus: si tenuis & syncerus, statim supprimendus erit. Aëtius elidit venam basilicam brachij dextri, vbi affectus hepar obsidet, quem perspicue detegunt dolor, & tumor eiusdem hippochondrij, & vrinæ ruffæ.

Apparantibus humore melancholicū, i v.

aut atram bilem peculiaribus medicamentis: quandoquidem cum atra bilis præassata huius mali causam dederit, medicamentis quæ feruorem lenient, & absque manifesto calore crassum humorem extenuant, edomanda veniet. Cū verò humor melancholicus frigidus & siccus hanc protulerit, incidentia & extenuantia medicamenta caloris manifesti socia impune exhibebuntur, ut puluis hieræ, sarsæ parillæ, thamaricis, agallochi cum therebintina mistus. Quā obrem ad frenandam atram bilem usurpabuntur iuscula botraginis, buglossi, violarum, & melissæ, & syrupi è fumaria, & è pomis, cum aquis stillatitijs scolopendrij, lupuli & cassuthæ. Ad humorem verò melancholicum præparandum accommodabuntur lupulus, asplenium, cassutha, scolopendrium, polypodium, capparis, syrupus ex epithymo et oximel simplex, præcipuè in quintana, sextana et nonana, quæ remedijs magis incidentibus et attenuantibus quàm alijs febres indigent. Præterea ubi quartana non exquisita obrepit, alterius humoris cum humore melancholico perfusi ratio habenda erit, ut eadē opera simul medica portione ducatur. Nō solū sumptis, sed etiā admotis consilio Galeni procuranda est præparatio emollientibus
unctio.

unctionibus & cataplasmatibus utrique hypochondrio admoventis. Sacculi enim in lib. de compositione medicament. descripti commodè imponentur.

Purgantibus humorem melancholicum, aut atram bilem, ubi manifesta concoctionis suffragia se promunt, vel per epicrasim syrupis & apozematibus superiori libro descriptis, aut validiori medicamento. Si quidem, autore Hippocrate melancholici infra vehementius sunt purgandi. Ad hoc porro legitimū negotiū vsurpabuntur pilule Indę è lapide cyaneo, è lapide lazuli, è fumaria cū puluere hierę diacolocyntidos & azari ut plurimū singulorū scrupulo dimidio: confectio hamech, therebintina cū puluere hierę, & asari, & catholicū, & agaricus trochiscatus cū aqua vitę. Portio commodè parari poterit ex catholici dracmis tribus, vel semuncia: confectio hamech sesquidrachma vel drachmis duabus, confectio alkerkes scrupulo dimidio, syrupi è scolopēdrio 3.6. & ex decocto buglossi, cassuthę, chamędrit, corticū capparorū thamariscis, seminum anisi, florum genistę & persicorū, addendo folliculorū senarę, & epithymi, singulorū 3.2. Pręterea ad eundem scopum accommodabuntur, ubi signa concoctionis fauēt, clysteres purgates

ex fenna & hiera, diacolocyntidos, & alijs
eiusmodi pharmacis superiore libro expli-
catis. Omnes porro medici contendunt
pridie accessions potionem porrigendā
esse. At Hippocrates lib. de affect. docet ob
materiam agitatam die accessions medi-
camentum præbendum, cui humores ex-
peditius cedunt. Quinetiam Græci & Ara-
bes vno & eodem consensu vomitum præ-
scribunt. Sed inter se differre videntur, qd̃
illi post cœnam pridie accessions decer-
nunt, vt portio humoris continentis & fe-
brem infligentis simul cum æsculentis &
potulentis promptius excernatur, natura-
que die sequenti post sumptam theriacam
cum reliquijs humorum discutiendis ala-
crius certet. Arabes autem aliquando post
cibum, aliquando in principio. & fine ac-
cessions ob agitatam materiam frequen-
tius instituūt. Vomitum proritant asarum
& agaricus, in oximelite infusa, narcissi
bulbus, radix peponis, & radícula transfi-
xa furculis albi veratri infusa in oximeli-
te, vel hydromelite.

vi. Vrinæ & sudores mouentibus, vbi si-
gna coctionis se deregūt: quando quidem
belle & dextre omnia geruntur, quæ imi-
tatione & ope naturæ tentantur. Ante ma-
nifesta equidē concoctionis indicia, si diu-
retis

retica & sudores cientia exhiberentur, cō-
tumaciorem obstructionem inueherent,
duplicemq; aut triplicem quartanam in-
fligerent, sicque ægri salus perperam age-
retur. Vrinæ igitur, & sudores mouebun-
tur iusculis asparagi, rusci, graminis, & pe-
trofelini, aut syrupis capillorum Veneris,
hydromelite diuretico & vinis factitijs. Ga-
lenus & Mesues probant frictiones, & nō
improbant balneum, quod est parum tutū
splenicis, stomachicis, & hepaticis, & alijs
minimè insalubre. Huius loco Laconicum
tutius & commodius substitui poterit.

Reliquias præcipuè bustum humorum
discutientibus, siue adhibendo medica-
menta peculiaria & localia, siue vrinas &
sudores mouentibus, vbi coctionis indicia
se depromunt. Græci non pauca remedia
familiaria celebrarunt, vt chamædrim, bu-
glossum, verbenacam rectam, aspleniū, suc-
cum cyrenaicum, piper, myrrhā, & theria-
cam. Dioscorides extollit pentaphillum,
hypericum, buglossum, libanotidem, trifo-
lium, succum ruthæ, helyotropij semen, &
verniculum in dipsaci capitulo inuentum
& collo suspensum. Ex his peculiarib. me-
dicamentis electarium sic comparari pote-
rit, ex theriacæ veteris, conseruæ buglossi,
libanotidis, singulorum drachmis duabus

vii

H

assæ aromaticæ, confectionis alkerimes, radicis pētaphili singulorum ʒ. 1. & dimidia, florum genistæ, hyperici, foliorum ruthæ, radicis gentianæ, singulorum ʒ. 1. styracis, calamitidis, cinamomi, lacce, seu caucami singulorum drachma dimidia, myrihæ, castorei, singulorum scrupulo vno, croci, piperis singulorum scrupulo dimidio, Zibethi, ambræ, moschi, singulorū granis quatuor, cum syrupo è pomis, vel ex epithymo, vel scolopendrio fiat electarium, de quo sumatur pondus scrupulorum duorū, vel drachmæ vnius cum pane azimo, superbibendo vinum creticum, vel hydromel diureticum, vel vinum chamædris, fraxini, cæterach, & scolopendrij, vel liquorem vini stillatitij.

- xi.** Roborâtibus sumptis, vt diamosco dulci vel amaro, electario de gémis, confectione alkerimes, cortice citri conditi, vino absynthite, seu alio peculiari fastitio, conseruis borraginis, buglossi, theriaca, & aqua theriacali & admotis, vtpote si ventriculus elâguescat oleo è nuce moschata eiusdem regioni imposita, si lien afficiatur, oleis è genista, & capparibus, & alijs peculiaribus remedijs ritè & tempestiuè accommodandis, integræ & pristinæ sanitati restitui poterunt.

Sym pro-

Symptomata delentib. utpote horrore, i x
immoderatā appetentiā, lienis obstructio-
nem, scirrū; hydropem & paralyſim. Pri-
mū moleſta horroris occuſatio demulce-
bitur linimēto ex aqua vitæ, oleo irino, &
anethino cōparato, & laterib. calidis pedi-
bus admotis. Gal. præſcribit aliquot grana
piperis cū hydromelite. Celsus præſcribit
decoctum abſynthij, ſalvię, origani ventri-
culo & hypochōdrijs admouendū. Cū
verò appetentia immoderata ab humore
melancholico ꝑficiſcitur, peculiari victus
ratione humorē melancholicū præparan-
tibus, purgantib. eiufdē reliquias diſſoluē-
tibus, & partes intemperie mali fomité al-
terantib. ordine & ſenſim proſtigabitur. Si
lien obſtructione infeſtatur, tenuante vi-
ctus ratione humorē excrementitiū minu-
entibus, apparantib. apparatū purgantib.
& poſtremo roborantib. radicitus extirpa-
bitur. Quin etiā febr. quartanis ſcyrꝑhus
ut plurimū ſuccedit, quē demolliuntur, ac-
cōmodata victus ratio humorē minuētia
apparantia, purgantia ſupradicta, & admo-
ta emolliētia, & diſcutiētia, quæ ſuo loco
poſtea tradentur. Interim axiomata medicū
ſtudioſe eſt obſeruādū, ut à leuiorib. auſpi-
cemur, & ad valentiora ſenſim progredia-
mur. Scyrꝑho lienis ſæpenumero ſuccediē

hydrops, qui vel excitatur à flatibus alicuius humoris societate permistis. Vnde tympanites suboritur, qui scirrhus sublato victus ratione tenui, & flatus discutiente aquas ducentibus, hepatis, & ventriculi intemperiem alterantibus, & easdem partes roborantibus abigitur. Ascites peculiari victus ratione humorem serosum purgantibus, urinas & sudores mouentibus, per insensilem transpiratum attrahentibus, & hepar roborantibus expugnabitur. Leucophlegmaria victus ratione calfaciente, & siccante, humorem excrementitium præparantibus & purgantibus, urinas & sudores mouentibus, laconico & alijs præfidijs hepatis dispositionem frigidam alterantibus, & roborantibus, peculiaribus et localibus remedijs propulsabitur. Præterea paralytis, vt plurimum in febribus quartanis obrepit, quæ calfaciente, & extenuante victus ratione humorem mali causam effectricem incidentibus, tenuantibus, tergentibus, purgantibus, digerentibus, & roborantibus obliterabitur. Græci in hoc affectu parcius: Arabes vberius, habita ratione cœli Arabici sanguinem mittunt. Interim si affectus remedijs non cedat, sudores ope gaiaci, et sarsæ parillæ mouentia, balnea sulphurea, et causticum ad morum postremum.

stremo loco instituenda erunt. His ita stabilitis ad febres implicitas eiusdem, vel diuersi generis progrediendum est.

De Curatione febrium implicitarum eiusdem generis. Cap. XII.

Febbris implicita eiusdem generis in affectuum consentientium classe recensenda, veluti duplex tertiana, quotidiana et quartana ex copioso humore in varijs sedibus putrescente genita, quæ curatu faciliior quàm febris diuersi generis, vt continua, et mista intermittens. Verumtamen cum eadem indicationes à morbo et causa, vt in simplici intermittente, sic summam et obiter excutienda venit, septemq; remediorum præsidijs trucidatur.

Victus ratione peculiari ob vnumquemque humorem exuperantem, febrem infligentem, affectus diurnitatē, & vires ægrorantis. Etenim cum duplex tertiana ex humore bilioso circa hepar & venas meseraicas: quartana ex humore melancholico circa lienem, & mesareum vitium faciente, & quotidiana duplex circa venas meseraicas & ventriculum luxuriante, & putrescente, & in varias sedes sic deuoluto ingeneretur legitimam & tempestiuam victus rationē

postulat. Mesareum autem est publicum
omniū humorum receptaculum, pro quo-
rum qualitate & quantitate variæ febres
emergūt, quæ, vt tradit Alexander Aphro-
disæus, ob redundantem humorū colluui-
em in venis mesaraicis congestā continua-
rum typum retinent. Igitur duplex tertia-
na minus refrigerante & humectante, &
propter crassitiam magis incidente victus
ratione, quàm causus & febris, peracuta
indiget. Siquidē humor biliosus copia &
crassitie magis abundare videtur, quā in
simplici tertiana & minus laceffere, quàm
in continua. Vnde pleniori victu, quàm
in tertiana simplici, & continua, sed mi-
nus refrigerante, & magis incidēte, opus
est: duplex quartana ob humorem, quan-
titate & crassitie peccantē victus ratio in-
cidens, & extenuans, & plena ob virium
infirmiorem, & affectus diuturnitatem v-
t plurimū decerneretur. Interim seuerior ad-
hibenda erit cautio, quàm in simplicibus
febris; quòd illæ vt plurimū in febrem
continuum degenerant, breuiioresque ad
tempestiuas viuendi leges induciæ dan-
tur. In intermissionibus enim febrium au-
thore Hippoc. cibus exhibendus est. Por-
ro in restaurāte victu partes imbecillæ ci-
bis euchimis roborādæ, dispositio relictā
emen-

emendanda, & reliquiae humorum repurgandae erunt.

Minuentibus simul non seorsum humorem excrementitium, qui sedes non admodum dissitas obsidet. Etenim unum & idem medicamentum eodem itinere & negotio humorem mali sobolem ducit. Quippe agens prius in propinquum, quam in remotum vires suas exerit. Quocirca cum humores in prima corporis regione, copia & crassitie sedes non admodum seiunctas obtinet, simul non seorsum excernendi erunt. Si autem bilis exuperat, cholagogis: si humor melancholicus, melanagogis: si pituita phlegmagogis peculiari medicamento ducetur, ut tutior vacuatio & optatior praeparatio consequantur. Si quartana a pituita crassa, ut opinatur Aristoteles, causas trahit, ad epialam referenda venit, legitimaque portione humor minuendus est. Medicus autem sedulo spectare debet speciem & indiuiduum.

Vacuantibus, id est, sanguinis missione post cruditatis fermentum in primis venis vberiori fenore luxurians sublatum, ne duplex tertiana, aut quartana, aut quotidiana, in continuam degeneret, aut diuturnior euadat, aut saeuissima symptomata secum adferat. Quamuis enim testimonio

Hippocratis, febres tertio quoque die affligentes, sunt periculosiores, quæ intermittunt, abesse periculū significant. Tamen, quia aut in continuas facile mutantur, aut diuturniores & ancipites euadunt, sedula opera sunt curandæ. Nam vitio lienis cancrofi quartanæ funestæ succedunt, aut experimento Auicennæ in duodecimum annum protrahuntur; quod in multis hoc seculo obseruatum est. Mecænas, ut testis est Plinius, toto fere vitæ decursu febre laborauit. Quamobrem indicationes qualitatis, & quantitatis sanguinis, mutuabuntur ex capitibus supra commemoratis. Si quartana duplex, aut triplex obrepit, basilica sinistra: si tertiana duplex sollicitat, basilica dextra, in accessionū inducijs sanguis mittetur. Quādoquidem, teste Celso, sanguinem mittere in accessione hominē iugulare est. Preterea non sine superstitione cautione post inædiam sanguis mittendus est.

- 1 v. Præparantibus humorem excrementitiū siue biliosum, siue pituitosum, siue melancholicum, præsidij sumptis & admotis, quæ ob copiam & crassitiem humoris peccantis rite instituuntur. Cum autē humor multus, aut crassus, aut simul multus & crassus obstructionē, obstructio putredinē, putre-

putredo febrem inuehat, statim post vacu-
ationem humores multi & crassi apparādi
erunt, vt obstructione sublata putredo &
febris protinus euanescent. Medicus autē
debet studiose perpendere morbificę cau-
sę pręteritę expulsionē, pręsentis abla-
tionem, & futurę pręuisionem.

Humorem pręparatū purgantib. pecu-
liaribus remedijs, quę humorē peccātem
clysterib. vomitū cientibus, & potionibus
extirpabunt. Interim, authoritate Hippo-
quò natura vergit, eò ducere oportet. Om-
ni equidē ope enitendū est, vt dextrę adhi-
beantur subsidia, quorū beneficio vna ter-
tiana, vel quartana altera prior pfligetur,
ne æger in febrem cōtinuam periculosam
pręcipitetur. Cū. n. medicina (teste Hip-
pocr. in libr. de arte) sit morbos tollere, &
impetus obtundere, & à morbo victos nō
curare, medici sunt partes tutò & citò du-
plicem tertianam, vel quartanā, vel quo-
tidianam propulsare, & impetus obtūde-
re, à morboq; victos non curare, qualis est,
vt docet idem Hipp. quintana, quę tabi-
dis contingit.

Vrinas & sudores mouentia, roborantia
& symptomata emēdantia, ex superiorib. ^{v i. &}
capitib. petēda sunt, ne eadē sæpius incul- ^{v ii.}
care superuacaneum esse videatur.

*De Curatione febrium implicitarum diuersi
generis. Cap. XIII.*

Febres implicitę affectus dissentientes, vt pote hemitritei ex cōtinua & intermittente compositi, hectica & humoralis, essentialis & symptomatica sunt curatu difficiliore, quā simplices continuę, quę ab intempestiua & exuperanti aëris occurratōne, importuno et vario ciborū appulsu et molesta rerum externarum importunitate originem ducunt. Cū autem, auctore Galeno, omnes affectus, aut ab aëre aut ab his quę offeruntur, aut ab operibus exordium sumant, hi morbi inter se dissentientes ab insolita & inordinata aëris exuperantia, à varijs & caco-chymis alimentis, & laboris improbitate, præsertim hemitritei causas trahunt. Qualis equidē aër, tales spiritus, quales spiritus alimentorū beneficio, tales humores: quales humores, tales facultates & functiones emergunt. Quę omnia magis inualescunt, cū agentis robur, corporis pparatio, & diuturna mora simul conspirant, vt cernere est in autumno, qui propter aëris inconstantiam & inclementiam, corporum infirmitatem, & liberaliorē fructuum vsum, hos perniciosos affectus, præsertim hemitriteum profert.

Hanc

Hanc calamitatem sic Virgilius in Georgicis describit:

*Hic equidem morbo celi miserranda coorta est
Tempestas totoq; autumnu incanduit aestu,
Et genus omne neci pecudum dedit, omne ferarum
Corruptiq; lacus infecit pabula tabo.*

Quãuis hi affectus sint dubij & ancipites, tamen ægri non sunt usque adeò deperditæ sanitatis, quin adhuc curationi relinquatur locus, quæ septē remediorum capitibus continetur.

Victus ratione, quæ pro varia & peculiariori affectuum implicitorum dissentientium natura peculiariter, & tempestiuè instituitur. Primùm summa cautione obseruandum est in morbis anomalis & malè moratis ob variã humoris perfusionē longiorem morbi historiam, & virium imbecillitatē, tenuiorem victū non esse præscribendum, ubi exquisitus hemitriteus ex æqua humorū perfusione profectus obrepit, victus ratio mediocris contrarietatis particeps decerneretur, quæ vtriq; feбри ex æquo congruat. Vbi verò nõ exquisitus sollicitat p affectu et humore vrgētiore limitatior viuendi lex instituetur, q̃ humorem magis exuperatē, viriū robur, corporis naturā, et cælum spectabit. Interim victus ratio non admodum tenuis præscribenda erit,

quod, authore Auicenna, hæc febris diu-
tius protrahitur. Præterea sedulò obseruā-
dum est, ne alimentum sæuiente febris in-
termittentis accessione offeratur, potusq;
urgēte sit in principio eiusdem accessio-
nis exhibeatur. Nam febris vtraque conti-
nua et intermittens ob alimentum intem-
pestiuè ingestum nimio opere excandesce-
ret, potusque prisanæ ad demulcendam
sitim, in principio accessionis exhibitus
ob humores exagitatos, & à putredinis fo-
co in ventriculum effusos, in centroque
corporis contentos, feritatem affectus au-
geret, nisi opportunū vigoris tempus ex-
pectaretur, quo calor ad superficiem euo-
catur, simulque cum eo humores traijiun-
tur. Si verò febris hectica et humoralis, si-
ue continua, siue intermittens ægrum si-
mul exercet, vtrique feбри victus ratione
refrigerante et humectante, et putredini
obstante, prouidenter consulendum est.
Vbi autem febris symptomatrica simul cū
essentiali inuadit, urgentioris altero non
neglecto, habēda erit cura, cuius legitima
diætę instituendę methodus ex simpliciū
febrium curatione petenda venit. Porro
īnstaurs victus post morbi victoriā sem-
per est instituendus, qui virium et effluuij
iacturam reparabit.

Minuena

Minuentibus humorem excrementitiū, 117.
nempe bilem et pituitam æquo pondere
exuperātem, si est exquisitus hemitriteus.
Cum verò nō exquisitus sollicitat humor
magis luxurians, siue pituitosus, siue bili-
osus accommodatis præfidijs repurgabi-
tur. Interim humor peccans, qui primam
corporis regionem obsidet, ad colluuiem
minuendam optatiorem præparationem
& tutiorem vacuationem protinus exhau-
rietur, ne huius traiectio in magna vasa se-
uiores symptomata inuehat. Idem statuen-
dum erit de essentiali et symptomatica, vt
sordescens putredinis labes purgetur, pe-
riculosaq; huius symptomata eadem ope-
ra demulceantur. Si hectica et humoralis
simul immaniter affligunt, noxia humoris
peccantis portio blando pharmaco duce-
tur, quod feбри hectice minimè incommo-
dabit. Etenim fieri non potest, vt hectica
profligetur, nisi febris humoralis prius a-
dimatur.

Vacuantibus id est, sanguinis missio. 111.
ne, quæ pro magnitudine vtriusque affe-
ctus viribus, et temperamento ægrotantis
habitu corporis, ætate, cœli constitutione,
victus ratione suppressa, vel immodica e-
vacuatione, et futura actione læsa legitime
& tempestiue instituetur. Interim in hoc

studiose incumbendū est vt vrgentiori affectui, altero non neglecto occurratur, quī quidē, testimonio Galeni, vrget, vel propter affectæ partis præstantiā, vel affectus magnitudinem, vel malignitatem. Prudentis lanè est medici, tāquam ex alta specula præuidere cū quibus, & quot hostibus certandum venit. Si autem inflāmatiō partē principem occupat, mollienda erit vacuatio, quæ è regione eidem respondet, præsidiaque localia eodem negotio admouebuntur.

iiii. Præparantibus humores multos & crassos, qui ingentem obstructionem in hoc affectu pepererunt. Non solūm autem in prima, sed etiam in secunda ob febrem continuā & intermittentem delitescit obstructio, quæ peculiaribus subsidijs bilē & pituitam apparantibus, in hemitriteo expedienda venit. Sumpris & admotis supra commemoratis rite profligabitur. Hoc idē accuratè præstandū erit in febre humoralī, quæ febris symptomaticæ aut hecticæ comes existit.

v. Purgātibus humorē pituitosum & biliosum probè, apparatus in hemitriteo remedijs phlegmagogis, & cholagogis. In febre hectica & symptomatica cū humoralī implicita magna cautione adhibenda est
pura

purgatio, ne pro commodo, funestum incommodum consequatur. Interim ad legitimam & tempestiuam purgationē accingendum est, quæ affectum hūc adimit, sine quā alter nulla industria extrudi potest. Cū verò in hemitriteo bilis pituitam polluat, & putrefaciat, & velut continuo stimulo exagitet, feraque symptomata simul exciet, clementioribus & minus calidis medicamentis agendū erit quā in febre intermittente.

Roborantibus sumptis, vt saccharis, seu VI. conferuis, conditis, & tabellis, & admotis, vtpote epithematibus & linimentis peculiaribus, quæ iam fusiùs explicata sunt.

Symptomata emendantibus vt sitim, vigiliam immoderatam, coma, dolorem, gra VII. uitatemque capitis, & extremarum partium frigiditatem. Cū humores biliosi & pituitosi, falsi seu corrupti sitim pepererint, accommodatis pharmacis sunt purgandi, sine quorū legitima excretionē sitis nullo modo edomari potest. Cū verò calor & siccitas hanc inflixerint refrigerantibus & humectantibus demulcebitur. Dioscor. ad huius rei scopum tragacantham cum seminibus cucumeris tritam, & cum ouorum recentium albumine crudo dilutam

cataportia fingit, quæ tempore sitis sub lingua tenentur. Vigilia immoderata frontali bus et lotionibus suprà commemoratis abigitur. Coma seu somnus profundus clysteribus paulò validioribus, frictionibus, ligaturis, postremò vesicatorijs collo ad-
motis, & synapismis, si prioribus remedijs non cesserit morbus, expugnabitur. Aui-
cennas commendat ligaturas dolorem in-
fligentes. Capitis grauitas purgatione, re-
uulsione, deriuatione, clysteribus acribus,
cucurbitulis & apophlegmatismis, intem-
periemque alterantibus propellitur. Aui-
cennas prima 4. tractatu 2. cap. 19. suffitum
ex decocto chamæmeli, furfuris & rosarū
commendat. Si extremarum partium frigi-
ditas à caloris influentis penuria contra-
cta sollicitet, cibus euchimis fulciendus et
reficiendus erit æger. Si dolor hunc affe-
ctum progignat, humores peccâtes huius
symptomatis causæ effectrices purgandi,
flatus discutiendi, dolores leniendi, et par-
tes externæ calfaciendæ, vt eadem opera,
calor à centro ad superficiem reuocetur.

His ita stabilitis ad febris pestilentis
& sudoris britannici curationem
properandum est.

De

perientia satis atque satis fidem faciunt. Etenim Hippocrates libr. 3. Epid. Galenus libro primo de different. feb. & Auicennas 1. 4. tractat. 4. cap. decimo, contendunt à caliditate extranea, humiditate exuperanti, & austrina constitutione putrefactionem generari, & febres pestilentes excitari. Galenus & Auicennas scriptum, reliquerunt inter perniciofa inquinamenta à cadaueribus aërem contaminari, quo homines peculiari quadã sympatia promptius & citius afficiuntur, & inficiuntur. Inter hos etiam calidi & humidi poros apertos obtinentes, pueri, vtero gerentes, & intemperanter viuentes hac funesta & mortifera lue celerius corripuntur. Plinius verò prodidit lib. septimo cap. 50. senes ob siccitatem non ita facile conspurcari. Quinetiam alimenta vitata in causa manifesta recensentur, quæ in difficili annonâ corruptos & malignos humores ingenerant, effrœnatumque pestis affectum infligunt. Cæterum cum non desint plures eximij medici, qui contra sacra oracula, & magnorum authorum testimonia pestem à syderum cômistione, & cæli motu defluere censent, quorum supersticiosæ opinioni breuiter & obiter satisfaciam. Primum sacram Hieremiæ authoritatem
profe-

proferam, quæ hanc contumeliosam opinionem apertè demolitur, cum docet non esse metuenda signa, quæ timent gentes, subditque ad certam huius rei confirmationem, vanas & irritas esse earum leges. Huic diuino decreto astipulantur Basilius Magnus in Hexamerû & Genesi: & Diuus Ioannes Chrysostomus commentarijs in Matt. cum scripserunt. Nô mediocri iniuria cœlos & astra inurere eos, qui ab his aliquid vitij deriuari sibi falsò persuadent: quippe primam & puram formam à Deo impressam nunquam exuerunt. Horum certissimæ sententiæ minimè reclamant Plato in Epinomide, & Aristoteles libro nono Metaphis. qui prodiderunt astra corpora pura, simplicia, bona, non maleuola, corruptioni & mutationi minimè obnoxia, quæ nihil maligni in hanc inferiorem regionem impertire possunt. Nam astra & sydera suapte natura pura & simplici forma constantia aliam formam imperfectam obtinerent, ex qua aliquid impurum ad nos dimanaret. Nec est satis quod obijciant astra simplicia & minimè mala esse, sed vario eorum motu & congressu hanc mortiferam aëris pestilentis luem in hanc elementarem regionem dispergi. Siquidem cum astra sint pura, sint.

plicia, simplici que forma constent, nec minui, nec mutari, nec aliam formam in quouis loco & horoscopo adipisci possunt: sed calore viuifico, non elementari motu, & lumine vapores, exhalationes, & omnia metheora pro subiecta materia excitant, simul ventos suscitant, varias que constitutiones impellunt, quarum occurratone varij morbi emergunt. Aliud equidem est ex substantia & forma, & congressu aliquid maligni demitti, aliud calore cœlesti, lumine & motu vapores retrors ex cadaueribus, aquis stagnantibus, mineralibus, & ex specubus excitare. Plato in Epinomide non solum à simplici forma corruptioni & mutationi minimè obnoxia, sed etiam à motu, & congressu fœdum aëris pestilentis virus minimè induci, cum admiratur cœli, & syderum magnificam, decentem & optimam choream, quæ nullam perniciem in hæc inferiora diffundere potest. Si Hippocr. Galenus & Auicēnas, alijque grauissimi auctores astrorum & syderum meminerunt, eo animo tantum mentionem fecerunt, vt iam latius demonstraui, quod anni tempora, solstitia, & æquinoctia describerent. Quocirca astra, & sydera, & cœli calore, lumine & motu aliquid malignum in hanc inferiore regionem eiaculari nequeunt, cum id præstarent,

starent, aut vt qualitates, aut vt liquores,
aut vt corpora, quæ vt iam fusiùs explica-
tum est, nullo modo contingere possunt.
His ita constitutis, antequam contagiosa
causarum externarum sentina eluatur, cer-
ta curationis & præseruationis febris pe-
stilentis methodus describeretur, ad Deum
Maximum Summum huius vniuersitatis
architectum & moderatorem confugien-
dum est, qui Sacris testimonijs, vtpote lib.
2. Paralip. cap. 7. vera fide & pura mente in-
uocandus est, vtab hac pernitiôsa cõtagio-
ne se redimere possint homines. Quod ad
causam vniuersalem spectat, nempe foedâ
aëris impuritatem, primum pestis semî-
narium, magistratus præcipue sunt partes,
vt hæc venenata qualitas publicis ignibus
excutiatur, præsertim cum hæc mortifera
lues populariter grassatur. Hoc equidem
Empedocles, Acreon, Hippocrates in rem
hominum olim præstiterunt. Si à specubus
& aquis stagnantibus hæc maligna expira-
tio contrahatur, specus erunt occludendæ,
& aquæ stagnantes vel desiccandæ, aut a-
quarum alucis irrigandæ. Si hæc funesta
colluies à cadauerum strage & clade obo-
riatur, hæc humi recondenda protinus ve-
nient. Interim cum hæc immanior & fero-
cior febris pestilentis calamitas insidiatur,

magistratus etiam in hoc totus esse debet, ut homines periti eligantur, qui pro ægrorum curatione loca comoda, & ad affectum profligandum necessaria cōparabunt, medicique & chirurgi experti huic difficili negotio complendo præficiantur. Etenim si testimonio Hippocratis oportet in omnibus morbis non solum seipsum præstare oportuna facientem: sed etiam assidētes & exteriora, quanto magis in hoc funesto morbo omnia accuratius sunt accommodanda. Nunc ad curationem venio, quæ octo præsidiorum generibus perficietur.

1. Victus ratione, quæ in hoc versabitur, ut alteret, & malignitatem depellat. Primum cum, authore nostro Hippocrate in libro de flatibus aer sit vitæ & morborum author, æger cane peius & angue, aerem impurum & vitiatum vitabit, frueturque puro, lucido, & ad ventros salubres vergente, qui ignibus luculentis, aut suffitibus pro varia cœli constitutione accommodatis emendabitur. Cibi euchi non excrementitij, sed authore Auicenna prima quarti tractatu quarto capite quarto refrigerantes, acidi, desiccantes, putredini obsistentes, & malignitatem depellentes erunt. Primum gelatine, collata, pressa, destillata, instaurantia, hordea-

hordeata, panatellæ ex pane loto confectæ
& iuscula ex carnibus vitulinis, & pullorū
præparata cōparabuntur, quibus admisce-
būtur succi citri, limonū, arantiorū, scabi-
osa, pimpinella, oxalis, buglossus, & ea quæ
ad pestem profligandā faciunt. Cū autē
vires in hoc periculoso affectu elangues-
cunt, & sensim liquescunt, cibus paucus &
frequentior est offerendus. Quamuis verò
sit deiecta appetentia ad cibum sumēdum
cogendi sunt ægri: quandoquidem testi-
monijs Arabum, qui vtiliter concedunt, ab
huius morbi pernicie vindicantur. Qui fe-
bre diaria pestilenti conflictantur, parco &
paucō alimento sunt fulciendi, ne sudorū
impetus intercipiatur. Potus erit ptisana
ex hordeo, coriandro, seminibus oxalidis,
citri, cardui benedicti, & cidoniorū parata,
addēdo paucum acetum, quod sua natura
refrigerat, & putredini reluctatur, magisq;
biliosis quā melancholicis est peculiare.
Quamobrem victus refrigerās, & maligni-
tatem depellens pro natura ægri, & cæli,
quantitas pro viribus, ætate, & aëris con-
stitutione instituetur. Præterea in hoc ob-
nixè incumbendum est, vt in principio
morbi à somno arceatur æger, qui omnino
exitialis est, quoad insidiosa veneni labes
foras extrudatur.

Siquidem contra quorundam recentiorum opinionem somni tempore venenata qualitas intus remanet, & cordis substantiam promptius obsidet. Itaq; frictiones loco motus, & ligaturę dolorem adferentes decernendæ erunt, quæ hoc perniciosum virus intus delitescens foras euocabunt. Interim religio esse debet in porrigendis carnibus assis: Nam, authore Galeno, carnes assæ non sunt offerendæ ijs, qui acuta febre laborant.

*Gal. Comm. in
li. de rat. vict.
in morb. acut.
cap. 17.*

II. Malignitatem arcentibus & corroborantibus, quæ protinus sunt porrigenda, antequam contagiosa qualitas cordis substantiam occupet. Quippe, authore Galeno libro tertio de prælagitione expulsi-
bus, vbi venenata qualitas cordis substantiam obsidet, ægri deperditæ sanitatis euadunt. Porro alexipharmaca seu amuleta, quæ aëris pestilentis contagia excutunt, aut sunt simplicia, aut composita, eorumque alia sunt frigida, alia calida, quæ aut intus sumuntur, aut foris admouentur. Simplicia frigida censentur, aurum, argentum, acerum, bolus armenia, coriandrum, caphura, lapis bezoar, buglossus, borrago, myrobalani, ebur, semen oxalidis, nymphaea, thamarindi, portulaca, granum tinctorium, succinum, oxis Plinij, viola, coral-
lus,

Ius, os è corde cerui, cornu vnicornis, hyacinthus, smaragdus, vniones, margaritæ, granata, fragmenta pretiosa, & terra Lemnia. Alia sunt calida, acorus, aristolochia, absynthium, amomū, agaricus, allium, ambarum, angelica, ben vtrumq; bistorta, calamintha, calandula, dictamnus, eupatoriū, maiorana, balsamita, tormētilla, moschus, scabiosa, rutha, valeriana, chamædrys, pulegium, lisimachia, hypericum, myrrhis, saluia, abrotanum, carduus benedictus, galāga, cyperus, gentiana, melissophilum, myrrha, therebintina, spica nardi, nux moschata, betonica, tapsus barbatus, ocimum, rosmarinus, marrhubium, caryophilum, cinnamomum, cybeta, lignum aloës, & cortex citri calida, cuius succus frigidus est. Alia sunt composita, cuius coloniæ existunt, conseruē buglossi, violarū, scabiosæ, nymphaeæ, rorismarini, cortex citri condita, radix eryngij condita, myrobalani conditi, zinziber & zurumbet conditum ab Arabibus celebratum, quod Zedoaria nuncupatur. Inter composita medicamenta principatum tenent antidoti, vt theriaca & myrrhidarium, quæ præstantia & vtilitate ceteris prælucent. Sunt & aliæ, vt antidotus Ælij Gaij, qua utebatur Cæsar, & in alia in thesauris Mithridatis reperta, quæ ex cari-

carum pinguium, & nucis singulorum nu.
2. & foliorum ruthe nu. 20. & salis scrupulo
dimidio componitur, hanc mirificè extol-
lit Nicander. Quin etiam celebratur hoc
seculo antidotus de ouo, quæ excipit o-
uum numero primo, sublato albumine,
per huius acumen croco impletum, sub
cineribus positum, & ad nigredinem deco-
ctum, in pulueremq; redactum, radicis tor-
mentillæ morsus diaboli, angelicæ, pinpi-
nellæ, dictamni, Zedoariæ singulorū drac-
mas duas, theriacæ vncias tres, misceantur
omnia cum aqua scabiosæ, & rosarum, &
fiat electarium. Præterea syrupi peculia-
res prostant apud officinas, utpote è li-
monibus, ex acido citri succo, è scabio-
sa, è melissa, è buglosso, è borragine; ex
oxalide, è pomis, acetosus simplex, & o-
xisaccharum. Liquores stillatitij ex simpli-
cibus alexipharmacis comparantur, ut li-
quores stillatitij melissæ, scabiosæ, rosa-
rum, cardui benedicti, & alij huiusmodi.

Ex his omnibus componi possunt con-
dita, electaria, tabellæ, & pulueres, ut exē-
pli gratia: Conditum extemporaneū fingi
poterit, ex conseruarū borraginis, buglosi
singulorum vncia vna, boli armenij, terræ
lemniæ, singulorum drachma vna, rasuræ
eboris, spodij singulorū scrupulis duobus,
semi-

se minum citri, ocimi, pulueris diamargariti frigidi, ligni aloës, ofsis de corde cerui singulorum scrupulo vno, sacchari rosati quantum sufficit, fiat conditum. Ad eundem scopum comparabitur electarium ex theriacæ veteris metrhidatij singulorum vncijs duabus, conseruarum buglossi, oxalidis, carticis citri conditi singulorum vncia vna, boli armenij drachmis duabus, puluere radicum, zodoariæ, dictamni, pentaphilli, tormentillæ singulorum sesquidrachma, corallorum, rasuræ eboris, cornu cerui, santalorum singulorum scrupulis duobus, pulueris diamargariti frigidi, letitiæ Galeni singulorum scrupulo vno cum syrupo conseruationis citri fiet opiata, vel parabuntur tabellæ ex hisdem simplicibus alexipharmacis, cum saccharo aquis melissæ, & scabiosæ dissolutis & mistis. Conditorum & tabellarum drachmæ duæ, & antidoti drachma vna & dimidia, aut scrupuli quatuor cum stillatitijs liquorib. aut syrupis supra commemoratis æstate, & cum vino hyeme exhiberi possunt. Sunt etiam quedam, quæ foris admouentur, & malignitatem contagionis pestilētis abigunt, vt sacculi expulueribus alexipharmacorum compositi, olea hyperici, & scorpionibus, & pomum odoratum. Tamen studiose obseruandum est

quod ad præcautionē cū vino, aquis stillaritijs & syrupis, cū febris vrget, syrupis aut aquis stillaritijs, non cum vino ad augendum febris incendium instituantur. Quinetiam theriaca, aut mithridatium cū liquorib. permista, et ad præcautionem, & ad curationē regioni cordis vtiliter & cōmodè admoueri possūt. Siquidē febrī hectice pestilenti alexipharmaca sumpta, & admota, diariæ eadem & sudores & vrinas mouentia & huic quæ humiditates cordis depopulatur, omnia alia præsidia citò & rūtò opitulantur. Tamen vt pestis, authore Galeno, sine febre, vel cū febre grassatur, sic febris cum peste epidemicus, & sine peste peculiaris & minus perniciosus contrahitur.

*Lib. 3. Epid.
sect. 3.*

111. Minuentibus humorem maligna qualitate, aut quantitate exuperantem nullis datis inducijs, quod hic morbus sit effrenatus, & præceps, inopinatasq; insidias præ se fert. Galenus enim lib. 10. de different. feb. docet statim corpus repurgandū esse, antequam vires labascant & corruant, & febris pestilentis virus cordis substantiā occupet. Medicamentorū porro natura pro humoris peccantis conditione, quantitas pro viriū robore corporis, humoris & cœli constitutione, vtendi modus pro humoris motu

motu ritè præscribetur, semper additis his,
quæ alterant, & malignitatem propellunt.
Medicamenta autem peculiaria erunt, cas-
sia fistularis, manna, thamaryndi, myroba-
lani, rheum barbarum, agaricus, catapotia
ruffi, è fumaria, aggregatiuè, catholicum
& confectio hamech, aliaque eiusmodi cū
aquis melissæ, scabiosæ, cardui benedicti,
vel decocto sarsæ parillæ, cynæ, seminum
cytri & cardui benedicti infusa, vel dissolu-
ta: addendo syrupi è scabiosa, vel è limo-
nibus, vel è pomis ʒ. s. vel drachmas 6. boli
armenij scrupulum dimidiū. Hoc videtur
apertè contra multorum opinionem con-
firmasse Galenus lib. 5. Method. cap. 12. cū
scribit febre pestilenti correptos exsiccati-
onem postulare, corpusque potione, aut
vomitu purgandum esse. Cū autē natura
humorum corruptorum portione leuatur,
reliquias humorum perniciosorum expe-
ditius edomat, tuncque pustulæ vt pluri-
mum efflorescunt, sicque omnes salui eua-
dūt. Auicennas huic sententiæ astipulatur
prima 4. tract. & cap. eodem, cū prodidit
febrem pestilentem desiccationem, phle-
betomiam, & ventris solutionem ad verā
huius curationem requirere. Quod verò
Hippocrates docet lib. 3. Epid. quosdam
alui profluuiο perijisse, de alui profluuiο

symptomático & colliqueſcente hic locus intelligendus venit, cū eodem lib. ſect. 3. declarat aliquos per alui turbationem, tempeſtiuamque excretionem vrinarū ſanitati reſtitutos fuiſſe. Sed quidam obijciunt venenatam qualitatē poſt apparentē bubonem ad internas partes vi medicamēti elici poſſe. Huic incōmodo facilē occurrere licebit, ſi buboni emplaſtrum attrahens, vt ex ammoniaco, galbano, oppopanax, & theriaca concinnatum, & cucurbitulæ admoueantur. Adde quòd maligni humores ope medicamenti & robore naturę foras extruduntur, hoſteque ſic proſtigato nullum periculum expectandū eſt. Interim conſilium Hippocratis alta mēte repositū eſſe debet, vt quò natura vergit, eò ducentur humores. Si enim ſurſum irrepit humor, vomitū cientibus purgabitur: ſi in inteſtina deſpluatur, aluus clyſteribus erit ſollicitanda.

1111. Vacuantibus ſanguinem, vbi corpus eſt plethoricum, & vires non reclamant, vt cōfirmant Hipocrates lib. 4. acutorum Galenus lib. de curand. rat. per ſanguinis miſſionem: & Auicennas prima. 4. præſertim cū ab aëre corrupto originē ducit. Tamen Galenus in lib. de ſuccor. bonit. videtur improbare ſanguinis miſſionem, quæ

que in difficili annona à cibis cacochimis, humorum corrupta, & magna virium infirmitate nascitur. Etenim cū humores non solum in cordis substantia, sed in toto corpore nimio opere exuperant, viriumque infirmitas simul consequitur, sanguinis missio parum tuta esse videtur. Quod verò nonnulli recentiores sibi persuadēt sanguinis missionem exagitare humores, & eosdem per vniuersum corpus diffundere, tantum equidē abest, vt vacuatio humores impellat, & effundat, vt à corde & genere venoso virus statim & confertim detrahať. In principio febris vena est pertundēda, antequā venenata pernicies cordis substantiam occupet, affectus ferocior euadat, & vires supra modū elanguescant. Auicen. l. 4. tract. 4. cap. 10. in exanthematum & ethymatū curatione à sanguinis missione ante 4. diem auspicandum esse scribit: quòd tunc tēporis efferuescit sanguis, & exanthemata nondum se in apertum dederūt. Quamuis si corpus est plethoricū in signis sit sanguinis efferuescētia, exanthemataq; integrè non eruperunt, rursus parca manu necessitate urgente sanguis erit mittendus. Cæterum elidēda erit vena habita ratione partiū in quibus extuberant bubones, vt si pone aures emergant, cephalica; si sub

axilla mediana, si in inguine saphena perforatur. Cum verò pustulæ ob copiam & efferuescentiam in cute efflorescunt, mediana vel basilica secabitur, ut natura sanguinis maligni portione leuata in reliquias expeditius incumbat, impuritatemque venenatam ad cutim excutiat. Hæc tamen sanguinis missio non videtur esse instituenda post exanthematum eruptionem, nisi ob sanguinis copiam & excandescientiam febris inualescat. Cum venenata qualitas, spiritus, aut solidas cordis partes obsidet, repudianda est vacuatio.

- v. Præparantibus humore vel pituitosum, vel melancholicum, vel biliosum peculiaribus subsidijs, ut obstructione sublata propius mitescat affectus. Nam cum humorum copia obstructionem pepererit, hæc uti in alijs affectibus expedienda venit, quò natura humores peccantes celerius excernat aut medicamentis facilius cedant. Igitur cum humores biliosi obstructionem inuehunt, syrupus è cichorio simplici, & acetoso simplici cum aquis buglossi, oxalidis & eupatorii apparabuntur. Cum verò humor melancholicus id vitij inflixerit, syrupi è fumaria, è lupulis, è buglossis cum aquis melissæ, scabiolæ, & cardui benedicti mirifice opitulabuntur. Præterea cum retorridi & ferui-

feruidi euadunt humores, alterantibus, & malignitatem depellentibus sunt obrundendi, vt syrupis è limonibus, violaceo, & buglossò, ex oxalide semper additis peculiaribus alexipharmacis. Vnde Arabes legitimè & oportune instituunt aquam frigidam, & refrigerantia subsidia ad extinguendum caloris incendiũ, in duobus primis diebus ante ec̃thymatò & exanthematon eruptionem. Cum verò post tres dies incipiunt efflorescere, parum tuta sunt alterantia & refrigerantia, quòd humorem peccantem in partibus internis non sine magno discrimine retinerent, eorumque ad cutim eruptionem remorarentur.

Vrinas, & sudores cientibus, cum eò fe- v r i
runtur humores, veluti in diaria pestilenti, què sudorum eruptione soluitur. In alijs verò febris pestilètis differentijs vrinas & sudores mouentia sunt contra recentiorũ quorũdam opinionem parum tuta, nisi eò vergat natura, & meatus sint aperti. Quod autem apud magnos authores, pori cutis aperti, & astricti probantur, & damnantur: qui quidem in aère corrupto suspecti esse debet: quandoquidem exspiratio venenata non solum per os, sed per arterias ad cutim pertingentes in cordis arcẽ obrepunt, vt testis est Galen. lib. 1. de differ. feb. cap. 4.

K

Si verò humor malignus in corpore delitescat, pori cutis aperti non improbantur, quod humores mali effectrices expeditius effluunt, ægrique citius liberantur.

VII.

Exanthemata, eñthymata bubonem & carbunculum sanantib. quæ febres pestilentes sæpenumero comitantur. Primum exanthemata & eñthymata ex bile, aut sanguine efferuescente profecta grassantur ut plurimum post constitutionem australem vere potius, quam hyeme, & aliquando autumno propter humorum malignitatem, aggrediunturque frequentius calidos & humidos, pueros & adolescentes, rarius iuvenes, & rarissime senes, curanturque peculiari victus ratione, alexipharmacis minuentibus, vacuantibus, accelerantibus, sanantibus, & symptomata depellentibus. Victus ratio pro varijs exanthematum temporibus varie instituetur. Nam auctore Auicena. 1.4. tract.4. cap.10. in duobus primis diebus ad restringendam sanguinis efferuescentiam debet esse refrigerans: deinde temperatus statim eligendus, aut industria præparandus est, ne frigidior poros occludat, & exanthematum eruptionem remoretur. Alimenta porro debent esse in principio refrigerantia ad caloris extinctionem, & ad robur leniter astringentia, & circa exanthematum eruptionem post
retu-

retusam effervescentiam non ita refrigerantia, nulloque modo astringentia decernenda veniunt. Præterea victus initio tenuis est instituendus, qui tamen in pueris ob exuperantem calorem innatum, & continuam resolutionem paulò vberior & frequentior præbebitur. In materia venenata alexipharmaca sunt permiscenda, cuius generis sunt succi citri, limonum, semina oxalidis, & ocymi, mali citrij, folia buglossi, borraginis, pimpinellæ & violarum. Quinetiam alexipharmaca sumpta & admota iam commemorata statim ad malignitatem discutiendam sunt præscribenda. Cum verò corpus magna humorum impuritate sordescit, minuentia & mitia medicamenta statim sunt offerenda, antequam excandescat affectus. Id genus sunt leues clysteres, aut blanda medicamenta, veluti cassia, manna, & rheum-barbarum. Valida enim medicamenta nimio opere calfacerēt, atq; immoderatū alui profluvium non sine ægri discrimine proritarent. Post minuētia pharmaca, sanguinis missio, teste Gal. lib. 6. Epid. cōment. 6. protinus tentāda est, quia natura portione sanguinis leuata reliquias expeditius edomat, à sæuioribusq; symptomatib. vindicatur. Interim quātitas p viribus ægrotantis,

*Exanthematū
& ecchymatū
curatio.*

tēperamento, habitu & ætate, alijsq; coindicationib. detrahetur. Nō videtur autem reiteranda esse vacuatio, nisi exuperās sanguinis copia, & incendiū id suadeant, symptomatumq; feritas vrgeat. Cæterū his legitime & tempestiue administratis acceleranda sunt exanthemata præsijs, quæ materiam ad cutim excuriunt & maturāt, extincta prius sanguinis efferuescentia. Nam antequā effloruerūt in cutē exanthemata, sanguis excandescit, qui alimentis refrigerantibus, & remedijs refrigerantib. & leniter astringentibus obtunditur, cuiusmodi sunt syrupi è granatis, è ribes, & ex acetositate cytri. Ad cutim verò euocant, quæ urinas & sudores mouent, celebranturque ab Arabibus in hoc negotio, decocta lentium excorticatarum, tragacanthæ, ficuū & lacæ. Maturant aut suffitus & forus ex malua, althea, floribus chamæmeli, meliloti, anethi & violarum, & fursutibus tritici comparati, quos Rhases in vesiculis reponit, & maturādis exanthematib. admouet. Postquam cocta fuerint, post 7. diem acu aurea, ut docet Auicenn. sunt rumpenda, ne sanies diutius retēta altius serpat, & partes subiectas cauet. Desiccabuntur è vestigio post apertionem puluere aloës, myrrhæ, thuris, & terræ Lemnię. Symptomata testimonio
Auicenn.

Auicennæ comitantur exanthemata, veluti prurigo, quæ poros aperiētibus & detergentibus demulcetur. Sunt etiam quedam partes, quæ confluantur, vt gula, pulmo, oculi, nares, & intestina, aluiq; profluuiū consequitur. Hæ aut sic ab exanthematō iniuria vindicabuntur, vt gula gargarismis, decoctionis rosarum, rhois, & myrtillorum, addendo dianucon, & diamorrhō. pulmo linctu, syrupis è papauere, & rosis siccis, oculi, collyrijs, aquæ rosarū, aut decoctionis rhois, & sumach, addendo collyrium albi rhasis, & tātillū croci, nares odoramentis aceti, aures oleo rosato, pauco aceto, & glaucio, & intestina clystere ex decocto rosarū, rhois, sumach, orizæ, & oleo rosato cōposito. Sequuntur ordine bubo & carbunculus, qui simul aut seorsum erumpunt, febribusq; malignis, & pestilētibus, vt docet Auicenn. succedunt, et aliquando auctore Gal. febres prægrediuntur, aliquādo consequuntur, præsertim carbunculus, qui in regionib. calidis frequentius quàm bubo grassatur. Docet aut hic lib. 6. Epid. comment. 29. febres pestilentes à symptomate nomen sortiri, et sic post carbunculū oboriri. At lib. 14. Method. apertè etiā prodidit febres pestilentes ante carbunculum excitari. Siquidem contingit, vt vires ve-

gete, & validæ humoris venenati portio-
nem in partes externas depellant, carbun-
culusq; statim emergit, breuiq; tēporis ve-
stigio pernicioſa qualitas ita inualeſcit, vt
febrem pariant. Cū verò ſunt imbecillæ
& effœtæ, ſtatim primo veneni inſultu fe-
bris accenditur, carbunculusq; ſe poſtea
profert. Idcirco bubo ad claſſem inflamma-
tionum à Galeno relatus, & carbunculus à
ſanguine craſſo & retorrido genitus, ean-
dem victus rationem, alexipharmaca mi-
nuentia, & malignum humorem, vt in fe-
bre peſtilenti vacuâtia non diſſimilia, ſed
tantum ſubſidia peculiaria poſtulant. Non
equidem viuendi leges & pharmaciam v-
niuerſalem, niſi ob ſymptomatum atroci-
tatem immutant. Sed quia non pauci con-
tendunt poſt apparentia bubonis & carbū-
culi veſtigia ſanguinem minimè mittendū
eſſe, tutioremq; ſudoribus proliciendis
locum patere, hâc quæſtionē ſic breuiter di-
rimendâ eſſe cēſeo. Si ſanguis in principio
detractus eſt, ante bubonis & carbūculi e-
ruptionē, aut manifeſta ſecuritatis indicia
ſe pferunt, aut vires elanguēſcunt, aut inſi-
gnis adeſt impuritas, non videtur eſſe venæ
elidenda, ſed carbunculus & bubo alexi-
pharmacis intus ſumptis & admotis pecu-
liarib. remedijs oppugnabūtur. Si verò cū
magno

magno incēdio sanguis exuperat, febrisq;
 fœuissimis stipata symptomatib. post appa-
 rentē bubonē & carbunculum immaniter
 excruciat, viresq; adsint robustæ, omnium
 medicorū iudicio sanguis venit detrahēd⁹
 q; natura leuata reliquias minori negotio
 euincit, cor ad emunctoria venenatā quali-
 tatē simul cū sanguine ppellit, feraq; sym-
 ptomata simul mitescunt. Quod cōfirma-
 uit Gal. lib. 10. Meth. c. 10. cū prodiit ad
 carbunculi curationē, sanguinē ad lipothi-
 miā mittendū esse, vt putredo & incendiū
 imminuantur. In hoc negotio non videtur
 esse, cōtra quorumdā opinionem verenda
 exagitatio. Quippē si maligna substantia
 circa cor inhærescit, nulla per sanguinis
 missionem consequetur exagitatio, & si à
 corde, aliarumq; partium robore in partes
 extēnas cōmode extrudatur, sine vllō ex-
 agitationis detrimento belle & prospere
 hoc succedet. Quod præstandū est cū vi-
 res sunt vegetæ, plethora adest, incendiū
 vrget, symptomataq; anxie sollicitant. Vbi
 verò elanguescunt vires, insignisq; obrepit
 impuritas, pauciq; spiritus supersunt, san-
 guis nō videtur esse exhauriēdus, ne ob to-
 tam spirituum purorum iacturā inopinata
 mors immineat. Quò enim maior delites-
 cit impuritas accedente viriū infirmitate,

*Curatio bubo-
 nis & carbun-
 culi.*

tantò minor sanguinis euacuatio tētanda
est, qua spiritus pauci simul exhalāt. Quo-
circa in magno incendio, in exuperāte san-
guinis copia, in inflātionib. partiū prin-
cipum, vena est potius resignanda in prin-
cipio, quàm artis ope sudores proliciendi.
Nam in principijs morborū, in virib. copia
oppressis, in maligna qualitate, in partiū
principum inflātionib. præsentiissimū
censetur esse remediū sanguinis missio. Va-
cuatio verò, quæ fit beneficio sudorum in
principijs morborū, in obstructionib. in in-
flamationib. in copia obruente, in mali-
gna qualitate partē principē obsidēte, an-
te obstructionē expeditā, et exhaustā hu-
morū peccantiū colluiē est suspecta, maxi-
mè cū pori sunt obstructi, naturæq; motus
eò nō inclināt. Sudores equidē mouentiū
vices supplere feliciter possunt bezoardica
seu amuleta intus sumpta cōmemorata, &
accōmodata præsidia buboni et carbuncu-
lo admouenda, quæ postea sequuntur. Nā
sola remedia sudores cientia humores ex-
agitarent, & per vniuersum corporis habi-
tum sparsim dispergerent, certoq; naturæ
conatui obsisterēt, nisi eiusdē motus foras
huc atq; illuc vergeret, vt apparet in exan-
themarib. eēthimatibus, & febre pestilenti
diaria. In curando verò bubone attrahētia
&

& mollientia ab Arabibus probata, coepe cum theriaca coctū et admotū, cucurbitulæ, hirudines, maturantia & causticum seu abscissio cōmendantur. Post apertionē bubōis vlcus detergebatur, et cicatrix inducitur, nō alia methodo, quā quę in alijs vlceribus obseruatur. In obliterando verò carbunculo celebrantur refrigerantia, et discutientia, attrahentia: veluti cucurbitulę, hirudines, anus galli admotus, incisiones altius penetrātes, causticū crustā inducens, crustam adimentia ex butyro recenti, & vitello oui cōparata: deinde detergentia aliorum vlcerū more sensim instituenda. Sola reprimentia buboni et carbunculo imposita, sunt prorsus abdicanda, ne virus intrō cōpellant. In ardore aut carbunculi leniendo circa partes vicinas refrigerantia, sicuti oxycratum, et vnguentum nutritum tutius admouentur.

Symptomata demulcentibus, vt delirium, carum, syncopem, deiectam appetentiam, vomitum, alui profluvium, & extremarum partium frigiditatem. Deliriū profligatur clisteribus, oxyrhodino fronti & futuræ coronali admoto, aut pane cum seminibus papaueris albi, lactucę et rosarum permisto, & in principio adhibito; vena frontis secta, frictionibus singularum par-

VIII.

tium, & hyrudinibus naribus affixis. Carius clysteribus acrioribus, scapulis admotis, ligaturis dolorem infligentibus, sinapismis & vesicatoris superiori parti colli impositis abigitur. Syncope verò adimitur, vbi contrahitur aëre corrupto, si mutetur cœlum, aut suffitibus emendetur aër. Cùm autem à malignis vaporibus proficitur, alexipharmaca intus sumpta, & epithemata cordi, hepati, & testibus admota rite instituuntur. Appetentia deiecta propulsabitur cibus appetitum prostratum suscitantibus, intemperiem alterantibus, & putredini resistentibus, cuiusmodi sunt gelatinæ, consumpta, instaurantia, succis limonum, cytri & arantiorū simul perfusis. Si humores in ventriculo cumulati congesti id mali protulerunt, clysteres iniectione probantur, aut si nauseam mouerint, vomitu, vt placuit Auic. sunt excernendi. Ceterum si vomitus vrget, cōpescendus venit, præsertim cū vires fatiscūt, maligna q̃; qualitas iā excreta est. Vomitus autem sedantia sumpta, & admota regioni ventriculi iam supra cōmemorata hoc negotium scelericiter præstabunt. Alui profluuiū, quod à vehementi incendio colliquescente causas trahit, refrigerantibus sumptis, & clysteribus astringentib. & roborantib. admotisq̃ epithe-;

epithematib. regioni ventriculi, & hepatis
superponendis sedabitur. Cū extremarum
partiū frigiditas originē ab inflāmatione
ducit, venę sectione, alterantib. sumptis &
admotis tolletur. Si verò calor imbecillus
huius mali causam dederit: cibi euchimi
multū & citò nutrientes, veluti gelatinæ,
consumpta & instaurātia sepe & parū sunt
exhibēdi. Reliquorū symptomatū curatio
ex præcedentib. permistis semper bezoar-
dicis petenda est. Superest pestis præserua-
tio, quę in legitima & tēpestiua victus rati-
one alexipharmacis, & pharmacia cōsistit.
Primum viuendi leges versabuntur in de-
centi qualitate, quantitate, vtendi modo
& occasione sumendorum, admouendorū
educendorum, & faciendorum, quæ Hip-
pocrates ad aërem, laborem, cibum, potū,
quietem, somnum, vigiliā, & omnia medi-
ocria retulit. Cū aër sit vitæ nostræ author,
& omnium morborum seminarium eligē-
dus venit purus, aut si impurus necessario
obtingit, suffitibus accōmodatis alterabi-
tur. Qui degunt in aëre impuro & corru-
pto, vestib. serico potius quā lana conte-
xtis induantur, si facultates suppetant. Ci-
bi erunt pauci potius quā varij, euchimi
nec auara, nec liberaliori manu sumpti,
benè dentibus contriti, hora consueta, &

diu post exercitium ingesti. Vitandus erig
cibus, qui molestā ventriculo grauitatē, &
potius qui nausēā adfert. Vino vtendū erig
oligophoro, qđ à Rhase in regione æstuo-
sa, & cœlo calidiore dānatur, & prorsus in-
terdicitur. Interim inædia et intēperantia
in constitutione pestilenti obnixe fugien-
da erunt. Motus debet esse mediocris, qui
calorem innatum excitat, excrementa de-
pellit, & cōcoctionē iuuat, nullus crudi-
tem, immoderatus imbecillitatē & humo-
rum exagitationē inuehit, in aëre q; impu-
ro pestis contagia prōptius ingenerat. Sō-
nus mediocris concoctionē, paucus crudi-
tatem profert. Venus cane peius & angue
vitabitur. Affectus omnes sunt parum tuti,
nisi sola lætitia, quæ calorē innatū recreat
& excitat. Ira enim excandescentiā & hu-
morum exagitationē, tristitia spiritūū con-
sumptionē adfert. Sequūtur alexipharma-
ca suprā cōmemorata, veluti theriaca, mi-
zhridatium, confectio ex ouo, è iuglandib.
ficubus, et rutha, quæ necessitate vrgente
sumenda erunt. Restat pharmacia, quæ ca-
cochimis tantū congruit, qui catapotia pe-
stilētia per interualla deuorare poterūt.
Qui plethora laborant, aut extenuante vi-
tus ratione, aut sanguinis missione indi-
gent. Arabes causticū alicui parti impositū
com-

commendant. Satis de febre pestilenti dictum est, nunc de sudore británico differendum venit, cuius integra curatio tria remedium capitā cōplectitur, vtpote legitimā victus rationē, accommodatū bezoardicorum vsum, opportunā & tempestiuā sudorum extractionē. Victus tenuis primo loco instituetur, ne liberalior frugiferā sudorū eruptionē intercipiat. Si aut vires vegetæ ferre possent, ab omni cibo interdiciendū essent ægri, ne eiusdem occurſu naturæ motus interrumpatur. Tamen quia hoc effrenato affectu correpti, stomachi, & capitis dolore feruido cruciantur, sitiq; molesta importunitate anxie diuexantur: huic demulcendæ ptisana & syrupis è limonibus, è granatis, violaceo, alijsq; eiusmodi succurrendum erit. Cū verò pernicioſa humorum illuies cor labefactet, & obterat, alexipharmaca in febre pestilenti tradita cōmodè exhibebuntur. Cæterū sedula debet esse cautio in eliciendis subdorib. qui quidem si subsistūt, repente è medio tollitur: si vberius effundantur, foetido sudore exoluitur eger. Quocirca in dignoscendis viribus pulsus tāquā certissimus testis est exacte perpendendus, qui si languidus apparet, exuperans sudoris profluuiū artis præsidij compescendum venit. Aër enim re-

*Sudoris Britā-
nici curatio.*

frigerans industria apparandus, molliq̃ue
velte contegendus erit æger, cuius sinistre
māmæ epithema, & cataplasma ex rosis,
sumach, rhoe: & palmulis comparatū ven-
tri inferiori ad sistendam sudorum eruptio-
nem ritè ad mouebuntur. Vbi verò sudor
supprimitur, copiosioribus stragulis vten-
dum erit, calidior aër inducetur, somnus
cōciliabitur, syrupi sudorē cientes exhibe-
buntur, & clysteres iniicientur. Non dissi-
mili modo accidit in hac febre, vt in synco-
pali ab Arabibus minuta dicta, in qua pro-
pter humorum tenuitatem & resolutionē
periclitantur ægri. Ab hac etiam non mul-
tum differt febris cardiaca, cuius Celsus &
Græci recentiores meminerunt. Quamob-
rem in hoc perpetuo incumbēdum est, vt
ad motam manu carpo pulsus exploretur, vi-
riumq̃ue rōbur certo perpendatur, & me-
diocre adsit sudorum profluuium. Vt hoc
assequi liceat hoc morbo correpti in lecto
continebuntur, pedes & manus quantum
feri potest ob sudorum suppressionē neu-
tiquam iactabunt à noxijs animi affectibus
arcebuntur, in spem prosperæ valetudinis
erigentur, gelatinis instaurantibus, & hor-
deatis fulcientur, si in ædiam propter viri-
um infirmitatem ferre nō possunt, ptisana
ad sedandā sitim vrentur. Celsus in cardia-
co af-

co affectu, nisi necesse est non esse festinan-
dum ad vinum, censet. Odores, qui à Gre-
cis & Arabibus ad re sarcendam spirituum
iacturam commendantur: huic affectui su-
pra modum conferre poterunt, cuiusmodi
sunt aqua rosarum, acetum, vinum & san-
tala. Interim etiam alexipharmaca oportu-
ne instituantur: nisi equidē hęc dextre ad-
ministrantur, ægri aut sunt deperditæ san-
tatis, aut in eundem affectum sæpe relabū-
tur, vt cronica Anglorum apertē declarāt.

Quare methodicam febrium curationē
sigilatim perstrinxi: nunc eodē ordine ex-
plicandum est, quibus viuendi legibus,
qualibus, & quantis præsijs, paucis, vel
pluribus, vna vel recidiua vice repetitis,
quomodo, per quē locum, & quādo mor-
bi singularum partium sunt profligandi.



ERRATA

Pag. 13. lin. 23. pyrotechnia. pag. 46. 16. liberalius cenata
post interiit vitabitur. pag. 77. 3. sphacelismo. pag. 82. 13.
tenuans. pag. 87. 27. formabuntur pag. 98. 10. febresq;
pag. 107. 24. chamædri. pag. 108. 1. hiera diacolocyntidos.

Method. Substantia.	Pag.	1
Enz. diaz. feb. is.		16
{ Synochi no pñ. Vis.		22
{ pñ. Vis.		27
Contin. { hectica		32
Contin. { Continua		44
Contin. { de creditate		60
Contin. { Symptomati. can.		69
Enz. li. dian. a.		84
Inter. mit. lentes. { Tertiana		94
Inter. mit. lentes. { Quartana		101
Inter. mit. lentes. { Simplicit. ejusdem gr. is.		113
Inter. mit. lentes. { Diversi gr. is.		118
Pest. h. m. is.		125
Ludoris Britanni. c.		153



